

Dépendance aux médicaments : Journée SVM – fordd – ARIA :
27 septembre 2001 : bibliographie sélective

Etablie par le Centre de documentation en santé publique (CDSP)
 Rue du Bugnon 21, CH- 1005 Lausanne, tél. 021 / 314 73 90 ; téléfax 021 / 314 74 04
 Site : <http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/selection/home.htm>
 E-mail : Cdsp@hospvd.ch
 Heures d'ouverture : Lu au Ve : 9h-18h (Ve : fermeture à 16h)

Cette bibliographie contient une sélection de références :

- du catalogue SAPHIR Swiss Automated Public Health Information Resources
<http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdfm/cdsp/saphir.htm>
- du catalogue RERO Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale <http://www.rero.ch/>
- de la BDSP Banque de Données en Santé Publique (France) <http://www.bdsp.tm.fr/>
- de la base de données DOCTES de l'Unité d'Education pour la Santé (Belgique)
<http://www.md.ucl.ac.be/entites/esp/reso/>
- de la base de données Medline <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/>

Ces références sont classées par ordre chronologique décroissant.

I. Ouvrages	p. 1-7
II. Articles	p. 8-11
III. Sites internet	p. 12

I. Ouvrages

Psychotropes et dépendance : profil des consommateurs et trajectoires de leurs comportements / Michèle Baumann, François Alla, Fabienne Empereur. - Paris : OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies); Vandoeuvre-lès-Nancy : Université de Nancy. Ecole de Santé Publique, 2001. - 95 p. : tab., 21 cm. - (Etude / OFDT)

Notes :Bibliographie p. 77-81. - No d'inventaire : 50/00

ISBN :2-11-092703-8

Auteur(s) :Baumann, Michèle; Alla, François ; Empereur, Fabienne

Résumé :0. Méthodologie. 0.1. La population. 0.2. Le recueil de données. 1. Les facteurs associés à la consommation de psychotropes. 2. Trajectoires de consommation et caractéristiques. 3. Attitudes [des consommateurs] à l'égard des médicaments psychotropes et de la dépendance. 4. Usages des psychotropes et vécu de consommation (caractéristiques sociodémographiques; les perceptions des consommateurs sur leur consommation; âge de la première consommation de psychotropes; les raisons de la consommation initiales; les signes de la dépendance associés à la prise et au manque de psychotropes; etc). 5. Livret envoyé par voie postale : "Votre point de vue sur les médicaments psychotropes" (inspiré du "Questionnaire des représentations spécifiques des médicaments", Sabran et al 1995); Entretien téléphonique (consignes, guide d'entretien).

Bibliothèque:3 - IUMSP Institut univ. de médecine sociale et préventive

Cote :SA-02905

Classement :WM-270-F-Bau-2001

Note : catalogue SAPHIR

L'automédication : pratique banale, motifs complexes / sous la dir. de Thierry Buclin et Catherine Ammon ; codirection V. Barras... [et al.]. - Genève : Médecine et Hygiène, 2001. - 288 p. : tab., 24 cm. - (Cahiers médico-sociaux)

Notes :Bibliogr.

ISBN :2-88049-159-2

Auteur(s) :Buclin, Thierry. Dir. ; Ammon, Catherine. Dir.

Résumé :[Table des matières] 1. Aspects épidémiologiques et de santé publique. 1.1. L'automédication, une pratique en quête de sens : sa place dans le self-care et la promotion de la santé. 1.2. Epidémiologie de l'automédication : données suisses et aperçu des données d'autres pays. 1.3. Profil de "l'autoconsommateur pharmaceutique" en Suisse. 1.4. Polymédication et automédication chez la personne âgée : résultats du programme national de recherche "Vieillesse". 2. Aspects pharmacologiques et cliniques. 2.1. De l'automédication à la non-observance thérapeutique. 2.2. Profil pharmacologique des médicaments disponibles en vente libre. 2.3. Les risques des médicaments utilisés en automédication, et leur détection en Suisse. 3. Aspects juridiques et économiques. 3.1. Le régime d'enregistrement des médicaments pour l'automédication. 3.2. Aspects marketing de l'automédication. 3.3. Automédication et pharmacie d'officine : une enquête genevoise. 4. Aspects psychologiques, culturels et sociaux. 4.1. Automédication, revues tout public et choix politiques. 4.2. Automédication et recours aux soins alternatifs : du comportement déviant à la responsabilité de soi. 4.3. La programmation chimique de soi. 4.4. L'automédication et le marché de la santé : "tu prends, tu paies, t'es bien !"

Bibliothèque:2 - CDSP (Centre de documentation en santé publique)

Cote :GPH-01058

Note : catalogue SAPHIR

L'abus de médicaments en Suisse : état des lieux et pistes pratiques / sous la dir. de Etienne Maffli ; contributions de Jérôme Biollaz... [et al.]. - Lausanne : SFA (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme), cop. 2000. - VII, 191 p. : tab., 24 cm.

Notes :Bibliogr. - Index p. 185-191

ISBN :2-88183-080-3

Auteur(s) :Maffli, Etienne. Dir. ; Biollaz, Jérôme. Collab.

Résumé :Ecrit dans un langage clair et accessible, cet ouvrage collectif et multidisciplinaire est destiné avant tout aux professionnels des domaines médicaux, sociaux et psychologiques, mais s'adresse également à toute personne cherchant des informations actuelles sur les tenants et aboutissants de l'abus de médicaments.
[Table des matières]
Partie 1. Etat des lieux et nouvelles données épidémiologiques. Médicaments présentant un risque d'abus. Evaluation de la consommation de médicaments à partir d'analyses statistiques secondaires. Ampleur et facteurs d'influence de la consommation de somnifères, d'analgésiques et de tranquillisants. L'usage de médicaments comportant un potentiel de dépendance. L'usage de médicaments chez les adolescents. Prévalence de la dépendance aux médicaments dans la population générale.
Partie 2: Domaines spécifiques.

Médicaments et conduite (dangers; médicaments et accidents de la circulation: données épidémiologiques; etc.). L'usage de médicaments sur le lieu de travail. L'usage de médicaments dans le milieu toxicomane. Le dopage.

Partie 3: Formes particulières de l'abus de médicaments.

Les intoxications médicamenteuses volontaires. Le suicide par prise de médicaments. Médicaments et troubles alimentaires. Les abus de médicaments des personnes âgées.

Partie 4: Traitement et prévention.

Traitement et thérapie. Abus et dépendance: réglementation de l'OICM. Prévention. Les bons médicaments n'ont pas besoin de publicité.

Bibliothèque:2 - CDSP (Centre de documentation en santé publique)

Cote :GPH-01060

Note : catalogue SAPHIR

Les pratiques addictives : abus et dépendance aux substances psychoactives / Michel Reynaud, Philippe Jean Parquet, Gilbert Lagrue. - [S.l.] : [s.n.], 1999. - 157 f. : ill., 30 cm.

Notes :Bibliographie p. 142-152

Auteur(s) :Reynaud, Michel; Parquet, Philippe Jean ; Lagrue, Gilbert

Résumé :[Table des matières]

1. Légitimité du concept d'addiction au regard de l'approche par produit. (les comportements de consommation de substances psychoactives; pourquoi parler de pratiques addictives? ; les éléments cliniques et épidémiologiques en faveur d'une approche commune des pratiques addictives; la voie biologique commune des pratiques addictives).
- 2. Les déterminants des pratiques addictives (comprendre l'installation d'une pratique addictive: les déterminants généraux de vulnérabilité; les déterminants psychologiques; les déterminants biologiques).
- 3. Les risques des pratiques addictives (une politique cohérente implique d'analyser, pour chaque produit: la dépendance, les dommages induits, la place sociale; le risque de dépendance; les différents produits et les différents types de risque).
- 4. L'état actuel des dispositifs de prévention et de soins (le dispositif de prévention et de soins aux toxicomanes; le dispositif de soins aux personnes en difficulté avec l'alcool; le dispositif de prévention et de soins aux tabagiques; évaluation critique globale).
- 5. Propositions pour une politique cohérente en matière de pratiques addictives.

Bibliothèque:5 - DGS-GE Direction générale de la santé

Cote :GB-00588

Classement :WM-270-Rey-1999

Note : catalogue SAPHIR

Gebrauch von Medikamenten mit Abhängigkeitspotential in der Schweiz / Etienne Maffli, Ute Bahner. - Lausanne : SFA (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme), 1999. - IV, 176 S. : Ill., 30 cm. - (Forschungsbericht / SFA = Rapport du département de recherche / ISPA ; Nr. 33)

Auf dem Umschlag: Abschlussbericht eines durch das Bundesamt für
Gesundheit geförderten Projektes - Bibliographie S. 165-176

ISBN :2-88183-067-6

Auteur(s) :Maffli, Etienne; Bahner, Ute

Résumé :Les résultats de l'enquête téléphonique révèlent une utilisation régulière (de plus d'un mois) largement répandue pour ce qui est des analgésiques (4,5%), des somnisfères (3,8%) et des tranquillisants (2,1%). De façon générale, on observe une surreprésentation significative de femmes prenant des médicaments de façon régulière ainsi qu'une augmentation globale de l'utilisation avec l'âge. Les résultats de l'enquête secondaire indiquent qu'environ 1% de la population de référence présente une dépendance médicamenteuse selon les critères du DSM-IV. Cependant, on observe également l'existence d'un groupe plus important estimé à 2,5% de la population adulte sujet à une consommation inadéquate de benzodiazépines, substances connues pour leurs effets néfastes lorsqu'elles sont prises à long terme. Les résultats de l'étude suggèrent que l'abus de médicaments reste un problème important en Suisse et que les efforts de prévention doivent se concentrer sur les benzodiazépines. <résumé, p. II>

[Inhaltsverzeichnis]

Literaturüberblick (Epidemiologische Befunde; etc). Methode.

Ergebnisteil: Gebrauch von Schlafmitteln, von Beruhigungsmitteln, von Schmerzmitteln, von Anregungsmitteln, von Appetitzüglern, von Abführmitteln, von Hustenmitteln. Medikamentenübergreifende Aspekte.

Bibliothèque:2 - CDSP (Centre de documentation en santé publique)

Cote :GPH-01045

Note : catalogue SAPHIR

Drogues et toxicomanies : indicateurs et tendances / OFDT. - Ed. 1999. - Paris : OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies), 1999. - 271 p. : ill., 24 cm.

Notes :Bibliographie. - No d'inventaire : 223/99

ISBN :2-11-091527-7

Auteur(s) :Observatoire français des drogues et des toxicomanies

Contient entre autres au chap. III : Indicateurs. 1. Les consommations de drogues en France : la consommation de drogues illicites chez les adultes, la consommation d'alcool chez les adultes, la consommation de tabac chez les adultes, la consommation de médicaments psychoactifs chez les adultes, la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments psychoactifs chez les adolescents.

Bibliothèque:3 - IUMSP Institut univ. de médecine sociale et préventive

Cote :SA-02603

Classement :WM-270-F-Dro-1999

Note : catalogue SAPHIR

Comité OMS d'experts de la pharmacodépendance / Organisation Mondiale de la Santé. (O.M.S.) Genève : OMS, 1999 (Série de Rapports techniques ; 887). - ISBN 92-4-220887-6. - 25p., réf.bibl.

Nouvelle édition

Depuis sa première réunion en 1949, le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, constitué de spécialistes internationalement reconnus des questions médicales et

pharmaceutiques relatives aux substances psychoactives, joue un rôle de premier plan dans le système mondial de contrôle des drogues. Le Comité recommande régulièrement la classification des substances psychoactives selon les dispositions des conventions de contrôle en vigueur, à l'élaboration desquelles il a largement contribué. Dans le présent rapport, le Comité passe en revue trois substances dont l'inscription à l'un des tableaux prévus pour leur contrôle avait été proposée et fait une analyse préliminaire d'autres substances qui pourront être examinées à l'avenir. Le rapport contient également des recommandations relatives à une proposition du Gouvernement espagnol visant à étendre le contrôle international de façon collective aux isomères, esters, éthers et analogues pharmacologiques de substances psychotropes sous contrôle. Le Comité examine également la faisabilité d'une mise sous contrôle du tabac dans le cadre des conventions existantes de contrôle des drogues. (R.A.).

Mots-clés PHARMACODEPENDANCE, STUPEFIANT, CLASSIFICATION, CONTROLE, COOPERATION SANITAIRE INTERNATIONALE, LUTTE, TABAC, MEDICAMENT PSYCHOTROPE

Note Banque de données en Santé Publique (France)

Automédication, autoprescription, autoconsommation : 2ème colloque de l'APNET / QUENEAU (P.) / dir. ; Association Pédagogique Nationale pour l'Enseignement de la Thérapeutique. (A.P.N.E.T.). – Paris : Montrouge ; John Libbey Eurotext, 1998. - 133p., tabl., graph. - ISBN 2-7420-0288

Cet ouvrage rassemble les communications données lors du 2ème colloque de l'APNET en décembre 1998. Le thème central de ce colloque est l'automédication et l'autoprescription. Après une définition des médicaments et une analyse de l'intérêt et des limites de l'automédication, les aspects traités sont les suivants : aspects sociologiques et psychologiques de la prescription, le marché de l'automédication, le point de vue des institutions, les contextes de l'automédication et les études prospectives.

Mots-clés MEDICAMENT, DEFINITION, PUBLICITE, AUTOMEDICATION, PRESCRIPTION, INNOVATION TECHNOLOGIQUE, PSYCHOLOGIE, PERSONNE AGEE, PHARMACIEN, ESSAI THERAPEUTIQUE, MARCHE, CONGRES, REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE, COMPORTEMENT SANTE, SOCIOLOGIE SANTE, MEDICAMENT SYSTEME NERVEUX, EDUCATION SANTE, OPINION PUBLIQUE, FRANCE, MONDE

Note Banque de données en Santé Publique (France)

La dangerosité des drogues : rapport au Secrétariat d'Etat à la santé / Bernard Roques ; préf. de Bernard Kouchner. - Paris : O. Jacob; [etc.], 1998. - XVIII, 316 p. : tab., 19 cm.

Notes :Bibliographie. - No d'inventaire : 187/00

Auteur(s) :Roques, Bernard

Résumé :Voici la synthèse scientifique la plus complète à l'heure actuelle sur les mécanismes généraux de la dépendance et sur les effets des différentes drogues, notamment sur le cerveau. Où l'on apprend en particulier que les dangers de l'alcool sont proches de ceux de l'héroïne et de la cocaïne, et que le tabac vient ensuite, avec les hallucinogènes, mais devant le cannabis. Ce livre met néanmoins en garde contre l'ensemble des drogues: aucune n'est dépourvue de toxicité, et toutes sont susceptibles d'engendrer des dépendances plus ou moins fortes. Une pièce essentielle dans le débat de la santé publique. <Editeur> [Table des matières] Pharmacologie et toxicologie: rappels sur les notions "effets-doses". Activation des systèmes hédoniques. Données récentes sur les mécanismes neurobiologiques. Neurotoxicité

centrale: l'exemple des psychostimulants. Usage de substances psychoactives et troubles psychiques. Imagerie médicale et effet des drogues chez l'homme. L'alcool. La cocaïne. L'ecstasy. Les opioïdes. Le cannabis. Le tabac. Médicaments et pharmacodépendance. Association de substances psychoactives à l'origine de dépendance et risques associés. Effets des substances psychotropes chez la femme enceinte et le nouveau-né. Toxicité potentielle des traitements substitutifs à la méthadone. Délivrance contrôlée d'héroïne. Pharmacothérapie des conduites abusives. Conclusions générales: étude comparative de la "dangerosité" des "drogues". Recommandations générales. Mise en place d'agences européennes et française d'études et de recherches sur la consommation des drogues.

Bibliothèque:3 - IUMSP Institut univ. de médecine sociale et préventive

Cote :SA-02797

Classement :WM-270-F-Roq-1999

Note : catalogue SAPHIR

Comité OMS d'experts de la pharmacodépendance : trentième rapport / Organisation mondiale de la santé, Comité d'experts de la pharmacodépendance. – Genève : Organisation mondiale de la santé, 1998. –VI, 56 p. ; 24 cm.

ISBN : 9242208736

Mesh : Substance-Related Disorders , Drug and Narcotic Control

RERO no : R233782160

Note : base de données VTLS, VAUD : Faculté de médecine [La 70]

La vie a différents visages, la dépendance a différentes causes / [texte: Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich] ; [trad. française: Sonia Marti]. - Lausanne : SFA (Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme), [ca 1991]. - 32 p. : ill., 30 cm.

Notes :Trad. de: Leben hat viele Gesichter, Sucht hat viele Ursachen

Auteur(s) :Zürich (Stadt). Suchtpräventionsstelle

Résumé :Le mérite de cette brochure est de replacer la consommation des drogues illégales parmi l'ensemble des comportements de dépendance, depuis l'alcool jusqu'au jeu, en passant par la nicotine, les médicaments et la télévision. Cette brochure montre de quelle façon les difficultés personnelles peuvent évoluer vers un comportement de dépendance à la faveur des incitations de l'environnement. En présentant d'une façon simple les mécanismes et les formes de la dépendance, elle permet à chacun d'agir sur les facteurs personnels et environnementaux qui sont en cause. <Extrait de l'éditorial de F. Paccaud>.
[Table des matières] 1. De la recherche à la dépendance. 2. La dépendance a différentes causes. 3. La dépendance est liée, non seulement à des produits mais également à des activités. 4. Attaquons-nous aux causes. 5. Les effets et les dangers des drogues légales et illégales. 6. Du plaisir à la dépendance. 7. La dépendance a différentes causes : présentation graphique. 8. Prévenir la dépendance signifie (ré)agir avant. 9. Offices de prévention.

Bibliothèque:6 - InfoDoc promotion de la santé c/o CDSP

Cote :FB-00666

Classement :WM-270-CH-Dép-1991

Note : catalogue

Aspects épidémiologiques et sociologiques de la consommation abusive de médicaments / Richard Müller. - P. 9-17 : ill., 31 cm.

Notes : Les cahiers du GREAT, 1990, 14, 2, 8-17

Auteur(s) : Müller, Richard

Résumé : La disponibilité des médicaments et la disposition des gens à les consommer est élevée en Suisse - chez l'adulte comme chez l'enfant. Peut-être peut-on expliquer cette propension à la consommation par le fait que la Suisse est une société qui prédispose à des réactions intropunitives et non extra-punitives.

Bibliothèque:6 - InfoDoc promotion de la santé c/o CDSP

Cote : FB-00055

Classement : WM-270-Asp-1990

Note : catalogue SAPHIR

Les toxicomanies médicamenteuses / REYNAUD M., CHASSAING J.L., COUDERT A.J.

Paris : PUF, 1989. -124 p.

ISBN: 2 13 042597 6

Résumé : Ce livre aborde tous les aspects des toxicomanies et abus médicamenteux, tant dans leurs dimensions sociologiques, économiques et politiques que dans leurs aspects psychologiques, cliniques et thérapeutiques. Les questions abordées portent sur les définitions (OMS, DSM III), la législation, l'épidémiologie, la clinique (description des conduites toxicomaniaques médicamenteuses, les produits utilisés, le dopage), le traitement.

Note : base de données DOCTES, France

II. Articles

Determinants for the use of psychotropics among nursing home residents / Sorensen L, Foldspang A, Gulmann NC, Munk-Jorgensen P.

Publication Types: Multicenter study

In : Int J Geriatr Psychiatry 2001 Feb;16(2):147-54

Department of Psychiatric Demography, Psychiatric Hospital in Aarhus, Aarhus University Hospital, Skovagervej 2, DK-8240 Risskov, Denmark.

PURPOSE: To characterise the prescription pattern of psychotropics in Danish nursing homes and to identify diagnostic, behavioural, cognitive and performance characteristics associated with prevalent psychotropic drug use. **METHODS:** Prescribed daily medication was recorded from nurses' files. Based on the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification index, psychotropics were categorised into neuroleptics, benzodiazepines and antidepressants. Two hundred and eighty-eight residents were diagnosed using the GMS-AGECAT. One hundred and eighteen staff members were interviewed about the residents's Activities of Daily Living (ADL), behavioural problems (Nursing Home Behavior Problem Scale), orientation, communication skills and if the resident had any psychiatric disorder. Multiple logistic regression was used to select the items that determined the use of psychotropics. **RESULTS:** Fifty-six percent of the residents received a psychotropic, 21% received neuroleptics, 38% received benzodiazepines and 24% received antidepressants. In the multivariate analysis, staff assessment of the resident's mental health was a determinant for the use of all types of specific psychotropics, whereas a GMS-AGECAT diagnosis only determined the use of neuroleptics. Behavioural problems were a determinant for the use of neuroleptics and the use of benzodiazepines irrespective of the psychiatric diagnosis of the resident. Use of antidepressants was associated with male gender and increasing age. **CONCLUSIONS:** Staff perceptions of psychiatric morbidity and norms have a greater impact on the prescription of psychotropics than standardised clinical criteria. Copyright 2001 John Wiley & Sons, Ltd.
Note: Ref. Medline

Appropriate use of psychotropic drugs in nursing homes / Gurvich T, Cunningham JA.

Publication Types: Review

Review, tutorial

In: Am Fam Physician 2000 Mar 1;61(5):1437-46

Glendale Adventist Medical Center, California 91205, USA.

The Omnibus Budget Reconciliation Act (OBRA) of 1987 limited the use of psychotropic medications in residents of long-term care facilities. Updates of OBRA guidelines have liberalized some dosing restrictions, but documentation of necessity and periodic trials of medication withdrawal are still emphasized. Antidepressant drugs are typically underutilized in nursing homes. Tricyclic antidepressants have many side effects and thus are not preferred medications in elderly patients. Anxiety and insomnia are common problems in the institutionalized elderly. If behavioral measures are not successful, antidepressant medications with shorter half-lives may avoid drug accumulation, which can lead to excessive sedation, cognitive impairment and an increased risk for falls. In the elderly, antipsychotic medications can cause serious side effects, such as extrapyramidal symptoms and tardive dyskinesia. Newer antipsychotic drugs are less often associated with these side effects, but they should be used only for specific diagnoses and when behavioral and environmental measures are unsuccessful.

Note: Ref. Medline

Psychotropic drug utilization in long-term-care facilities for the elderly in Ontario, Canada / Conn DK, Ferguson I, Mandelman K, Ward C.

Publication Types: Review

Review, tutorial

In: Int Psychogeriatr 1999 Sep;11(3):223-33

Department of Psychiatry, Baycrest Centre for Geriatric Care, North York, Ontario, Canada. d.conn@utoronto.ca

OBJECTIVE: Despite considerable data from a number of countries regarding psychotropic utilization in long-term-care facilities for the elderly, there has been a lack of similar data from Canada. The purpose of this study was to gather prescription data from a series of institutions in Ontario and to compare the results to those of other international studies. METHOD: Single-day surveys were carried out in six homes for the aged, four nursing homes, two retirement homes, and a veterans' center. The results were compared to those of recent studies from other countries. RESULTS: The data revealed considerable differences in rates of prescription between different classes of institutions and between similarly classified institutions. The prescription rate of neuroleptics ranged from 11.8% (of patients) in retirement homes to 29.8% in nursing homes. Antidepressant use ranged from 12.2% in nursing homes to 24.6% in homes for the aged, and benzodiazepine use ranged from 22.5% in nursing homes to 36.4% in retirement homes. CONCLUSIONS: The overall rate of prescription for psychotropic medications was somewhat lower than in most international studies. The rate of prescription of neuroleptics in nursing homes fell in the midrange of studies, somewhat higher than in recent studies from the United States and an earlier Italian study, but lower than in recent reports from Sweden, Austria, and Australia. The rate of neuroleptic use in homes for the aged was comparable to the rate in the U.S. studies. The overall rate of prescription of antidepressants and benzodiazepines appears to be comparable to that in recent studies from other countries.

Note: Ref. Medline

Consommation et prescription de médicaments chez les personnes âgées / SERMET (C.)

In : LES CAHIERS ALBERT LE GRAND. - No 140, p. 4-7 (1999), tabl., graph., réf.bibl.

-

ISSN 0526-7625

Editeur Paris : Association Française des Pharmaciens Catholiques

Résumé Dans une première partie, l'auteur vise à situer la consommation pharmaceutique dans le cadre global et plus général des dépenses de santé. Il analyse ensuite la consommation médicale et pharmaceutique des personnes âgées. La dernière partie de l'exposé est consacré à la prescription pharmaceutique chez les personnes âgées (caractéristiques de la prescription, coût et prescription selon la classe thérapeutique).

Mots-clés CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE, CONSOMMATION MEDICALE, PRESCRIPTION, PERSONNE AGEE, PHARMACODEPENDANCE, COUT, MEDECIN GENERALISTE, MEDICAMENT, AGE, SEXE, DONNEE STATISTIQUE, ENQUETE, DEPENSE SANTE, FRANCE, 1997

Note Banque de données en Santé Publique (France)

Antidepressant-treated patients in ambulatory care long-term use of non-psychotropic and psychotropic drugs / Bingefors K, Isacson D, Von Knorring L, Smedby B, Ekselius L, Kupper LL.

Publication Types: Clinical trial, Randomized controlled trial

In: Br J Psychiatry 1996 Mar;168(3):292-8

BACKGROUND. Despite the problems involved in treating depression and concomitant medical disease, there are virtually no longitudinal studies on drug utilisation among depressed patients. **METHOD.** Use of prescription drugs among all first-time users of antidepressants in a defined population five years before and six years after the index (first) treatment was compared to a referent group without antidepressant treatment. The generalised estimating equations (GEE) method was used for analysis. **RESULTS.** The antidepressant-treated group used considerably more non-psychotropic drugs during the whole study period than the referent group. They also used more psychotropic drugs, a use which increased in connection with the initiation of antidepressant treatment, and stayed high for a further five years. **CONCLUSIONS.** The high use of prescription drugs indicated widespread somatic and psychiatric health problems during the whole study period. Antidepressant-treated patients are at risk for drug interactions and adverse effects, and would benefit from a closer collaboration between psychiatry and medicine.
Note : Ref. Medline

Le risque en psychopharmacologie / MAGRON (P.), COUCHET (P.), FAVRE (P.), DE
BEAUCHAMP (I.), et al.
In : L'INFORMATION PSYCHIATRIQUE. – Vol. 72, no 10 (1996) ; p. 975-1008, réf.bibl.
ISSN 0020-0204
Mots-clés MEDICAMENT PSYCHOTROPE, FACTEUR IATROGENE,
PHARMACODEPENDANCE, PEDOPSYCHIATRIE, PRESCRIPTION, RISQUE,
AGITATION, France
Note Banque de données en Santé Publique (France)

Actualités des médicaments psychotropes / DENIKER (P.), OLIE (J.P.), PEYRE (F.), et al.,
FELINE (A.) / préf.
In : LA REVUE DU PRATICIEN. – Vol. 44, no 17 (1994) ; p. 2283-2342, tabl., graph.,
réf.bibl.
ISSN 0035-2640
Mots-clés MEDICAMENT PSYCHOTROPE, HISTORIQUE, DUREE TRAITEMENT, ETAT
DEPRESSIF, TROUBLE ANXIEUX, RECHERCHE PHARMACEUTIQUE,
PHARMACODEPENDANCE, EFFET SECONDAIRE, PHARMACOCINETIQUE
Note Banque de données en Santé Publique (France)

Chemical dependency in the elderly : the enabling factor = Chimiodépendance des personnes
âgées : l'importance de la médiation / TABISZ (E.M.), JACYK (W.R.), FUCHS (D.),
GRYMONPRE (R.)
In: CANADIAN JOURNAL ON AGING : LA REVUE CANADIENNE DU
VIEILLISSEMENT. – Vol. 12, no 1 (1993) ; p. 78-88, tabl., réf.bibl.
Résumé On reconnaît la gravité du problème de la chimiodépendance chez les personnes
âgées depuis le début des années 1960. Par contre, peu de praticiens ont élaboré
des programmes d'intervention ou de traitement destinés à ce groupe d'âge. C'est
en mettant au point un projet de recherche appliquée, le Programme de services
de santé aux aînés, que l'on s'est rendu compte qu'il fallait se pencher sur le
problème des comportements de médiation. La médiation active des membres de
la famille et des professionnels est en effet devenue un facteur important dans la
conception des programmes d'intervention et de traitement (résumé d'auteur).
Mots-clés PERSONNE AGÉE, PHARMACODEPENDANCE, FAMILLE, ROLE DU
PROFESSIONNEL, CANADA, MEDIATION
Note Banque de données en Santé Publique (France)

Le dossier noir des médicaments / COMPAGNON (J.M.), DELAFOND (P.)

In : MEDECINE DOUCE. – No 110 (1991) ; p. 41-78 (6p.), phot.

Date 1991/03

Volume, fascicule 110

ISSN 0292-3747

Résumé Ce dossier attire l'attention des lecteurs sur les dépendances médicamenteuses, notamment les dépendances aux tranquillisants, aux anti-tussifs, aux laxatifs. Le sevrage des pharmacodépendances est souvent délicat, et le Dr P. Delafond propose de le faciliter grâce à la phytothérapie, aux oligo-éléments, et à l'homéopathie.

Mots-clés PHARMACODEPENDANCE, MEDICAMENT, ABUS MEDICAMENT, TRANQUILLISANT, PHYTOTHERAPIE, OLIGOELEMENT, HOMEOPATHIE, MEDECINE ALTERNATIVE, FRANCE, 1990

Note Banque de données en Santé Publique (France)

Médicaments et pharmacodépendance : demande des patients et prescription médicale / GACHIE (J.P.), COUDRAY (P.), DAMADE (M.), SERISE (A.M.) ;

In : LA REVUE FRANCAISE DE LA SANTE PUBLIQUE. – No 33 (1986) ; p. 62-67, tabl.

ISSN 0182-8819

Congrès Médicaments et santé publique / Societe Française de Santé Publique. Vandoeuvre lés Nancy. Paris, France

Résumé Il est classique de souligner l'importance des prescriptions médicales dans les toxicomanies actuelles & dans l'approvisionnement "légal" des toxicomanes Une étude concernant l'information et l'attitude des médecins généralistes face aux demandes de leurs patients habituels, de leur clientèle de passage et des toxicomanes se présentant en tant que tels a été menée par le Laboratoire de santé publique et le comité d'étude et d'information sur la drogue de Bordeaux grâce à un financement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sur un échantillon représentatif de 286 médecins généralistes d'Aquitaine. La méthode utilisée a été l'interview semi-directe.

Mots-clés MEDICAMENT, PHARMACODEPENDANCE, PRESCRIPTION, TOXICOMANIE, CONSOMMATEUR SOINS, DEMANDE EXPRIMEE, ENQUETE, AQUITAINE

Note Banque de données en Santé Publique (France)

