



Assistance pharmaceutique

ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS PAR SONDE ENTERALE OU LORS DE PROBLEME DE DEGLUTITION : COUPURE / PULVERISATION DES COMPRIMES ET OUVERTURE DES CAPSULES

Couper ou pulvériser un comprimé ou ouvrir une capsule en vue d'une administration chez un patient porteur d'une sonde d'alimentation entérale ou avec problème de déglutition est une pratique courante en milieu hospitalier. De façon générale, les formes pharmaceutiques solides ne sont ni conçues, ni testées par les fabricants pour être administrées par sonde entérale. Le tableau ci-dessous répertorie les formes pharmaceutiques orales solides (comprimés, dragées et capsules) les plus courantes utilisées au CHUV et dans les hôpitaux affiliés et doit aider le personnel soignant à administrer ces médicaments. Les alternatives possibles sont également signalées.

Les principes généraux d'administration de médicaments par sonde d'alimentation entérale, rédigés en collaboration avec l'unité de Nutrition Clinique, sont décrits dans le **Bulletin d'Information n° 1-2005** du Service de pharmacie (Aller sous Intranet => Application médicale => Liste des médicaments).

Il est important de rappeler les points suivants :

- Les formes **liquides** (solutions, suspensions, émulsions, sirops, gouttes, etc.) ou les **comprimés effervescents** doivent être préférés aux formes solides. Pour la Pédiatrie, il faut vérifier que la forme orale liquide soit adaptée à l'âge de l'enfant. Les sirops (avec ou sans sucre) et les gouttes sont souvent hyperosmolaires et devraient être dilués 1:1 avec de l'eau avant administration par sonde.
- Il ne faut pas couper ou pulvériser les comprimés ou ouvrir les capsules (gélules) à l'avance. Les principes actifs peuvent se dégrader au contact de l'air, de l'humidité ou de la lumière.
- Les **comprimés sécables** (avec rainure sur une ou deux faces) peuvent être coupés. Il est préférable d'utiliser un coupe-comprimé.
- Les **comprimés simples** ou **enrobés** (synonyme : filmés ou pelliculés) peuvent être broyés le plus finement possible dans un mortier propre, puis dilués dans un peu d'eau avant d'être administrés.
- Les **comprimés buccaux**, les **capsules molles**, les formes « **retard** » ou à **libération modifiée** (SR, ZOK, LA, etc.) et les comprimés **multicouches** ne doivent pas être écrasés.
- Les **comprimés à revêtement gastro-résistant** ne peuvent être écrasés que s'ils sont administrés au moyen d'une sonde duodénale ou jéjunale. Les **capsules à enrobage gastro-résistant** ne peuvent être ouvertes que dans les mêmes conditions. Par contre, les capsules contenant des microgranules (pellets) gastro-résistants (ex: Agopton®) peuvent être ouvertes et les comprimés d'AntraMUPS® dispersés, mais en aucun cas écrasés lors d'administration par sonde gastrique.

- Le passage d'une forme retard ou à libération modifiée à une autre forme pharmaceutique se fera avec l'**accord médical** en considérant la **posologie respective** des deux médicaments.
- Avant l'administration, il faut tenir compte du **moment de prise** et de l'**interaction** du médicament avec les aliments ou la nutrition entérale.
- Certaines substances sont susceptibles de provoquer des **irritations locales** (anti-inflammatoires, fer, etc.).
- Les **immunosuppresseurs** doivent être manipulés avec précaution (port de gants, d'une blouse et d'un masque de protection).
- Pour les médicaments **anticancéreux** et **cytotoxiques**, se référer aussi à la directive institutionnelle.
- Pour les **médicaments anti-HIV**, se référer aussi au tableau correspondant.

En cas de doutes ou de questions, vous pouvez consulter l'unité Assistance pharmaceutique au 744 996 ou 021 314 49 96

Abréviations :

- Caps capsule dure (= gélule) ou molle
 Cpr comprimé
 dci dénomination commune internationale (= principe actif)
 Drag dragée (comprimé enrobé de saccharose).
 Réf référence
 SE administration par sonde d'alimentation entérale de la forme orale solide :
 O administration possible
 O ! administration possible, mais risque que la sonde se bouche (surtout avec les micro-granules)
 N administration impossible (voir les alternatives)

Malgré toute l'attention qui a été apportée à la réalisation de ce tableau, il a pu se glisser des erreurs ou des imprécisions. Les auteurs remercient d'avance les lecteurs de les signaler afin que celles-ci soient corrigées pour la prochaine version.

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
3TC (lamivudine)	cpr filmé 150 et 300 mg	Ne pas couper, ni écraser Alternative : 3TC solution buvable 10 mg/ml	N	1,3
Accupro (quinapril)	cpr filmé 5, 10 et 20 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Actos (pioglitazone)	cpr 15, 30 et 45 mg	Peut être écrasé	O	1,5
Adalat CR (nifédipine)	cpr à libér. contrôlée 20, 30 et 60 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard) Alternative : Aprical gouttes 20 mg/ml (D) (sans effet retard, ne pas diluer avec H ₂ O)	N	1
Adalat Retard (nifédipine)	cpr retard 20 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard) Alternative : Aprical gouttes 20 mg/ml (D) (sans effet retard, ne pas diluer avec H ₂ O)	N	1
Agenerase (amprénavir)	caps molles 50 et 150 mg	Ne pas couper, ni écraser Alternative : Agenerase solution buvable 15 mg/ml (Attention : 20 mg/kg d'amprénavir en capsules correspond à 22.5 mg/kg en solution buvable)	N	1,3
Agopton (lansoprazole)	caps avec granules gastro-résistants 15 et 30 mg	Peut être ouverte, mais le contenu (gastro-résistant) ne doit pas être écrasé	O !	1,2
Akineton (bipéridène)	cpr 2 mg	Peut être coupé (sécable en quatre) et écrasé	O	1,3
Akineton Retard (bipéridène)	cpr retard 4 mg	Peut être coupé (sécable en deux), mais pas écrasé (perte de l'effet retard)	N	1,3
Aldactone (spironolactone)	cpr enrobé 25, 50 et 100 mg	Peut être écrasé (l'enrobage sert à masquer l'amertume de la spironolactone) Alternative : Spironolactone suspension 2 et 10 mg/ml (UK)	O	1,3
Alkeran (melphalan)	cpr filmé 2 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Amaryl (glimepiride)	cpr 1, 2, 3 et 4 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Ampho-Moronal (amphotéricine B)	cpr 100 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : suspension 100 mg/ml ou cpr à sucer	O	1,3
Anafranil (clomipramine)	drag 10 et 25 mg	Peut être écrasée	O	1,3
Anafranil SR (clomipramine)	cpr retard (Divitabs) 75 mg	Peut être coupé (sécable en deux), mais pas écrasé	N	1,3
Androcur (cyprotérone acét.)	cpr 10, 50 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Antra MUPS (omeprazole)	cpr avec granules gastro-résistants 10, 20 et 40 mg	Ne pas écraser Peut être dispersé dans de l'eau ou du jus (garde l'enrobage acido-résistant) Antra MUPS 5 mg = ½ cpr à 10 mg (coupe-cpr) Alternative : Oméprazole suspension 2 mg/ml dans NaHCO ₃ 8.4% pour l'administration par sonde entérale	O !	1,3
Aphénylbarbit (phénobarbital)	cpr 15, 50, 100 et 200 mg	Peut être coupé (50, 100 et 200 mg sécables en deux) et écrasé. Alternative : suppositoires	O	1,3
Aricept (donépézil)	cpr pelliculé 5 et 10 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Arimidex (anastrozole)	cpr pelliculé 1 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Aromasin (exémestane)	drag 25 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Aspirine (aspirine)	cpr 100 et 500 mg à croquer 500 mg	Peut être écrasé Alternative : cpr instant 500 mg à dissoudre dans de l'eau	O	1,2

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Aspirine Cardio (aspirine)	cpr gastro-résistant 100 et 300 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de la gastro-résistance) Alternative : Aspégic sachets 100 mg	N	1
Atacand (candésartan)	cpr 4, 8 et 16 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Atarax (hydroxyzine)	cpr 25 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : Atarax sirop 2 mg/ml	O	1,2
Ateno Basan (aténolol)	cpr mite 50 mg cpr 100 mg	Peut être coupé en deux (sécable) et écrasé	O	1,5
Augmentin (amoxicilline / ac. clavulanique)	cpr enrobé 375, 625 et 1000 mg	Peut être dispersé dans de l'eau Alternatives : suspensions Trio, Trio Forte et sachets	O	1,3
Aurorix (moclobémide)	cpr 150 et 300 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Avalox (moxifloxacine)	cpr enrobé 400 mg	Peut être écrasé (l'enrobage sert à masquer le goût)	O	1,2
Bactrim (triméthoprime/ sulfaméthoxazole)	cpr 80 mg T/400 mg S Forte 160 mg T /800 mg S	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : sirop enfant (40 mg T / 200 mg S / 5 ml)	O	1,5
Benerva (thiamine)	cpr 100 et 300 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Becozyme Forte (vitamines du gr B)	drag	Peut être écrasée Alternative : Beco-5 ampoule prise par voie orale (composition différente)	O	1,4
Beloc COR (métoprolol)	cpr simple 10 et 50 mg	Peut être coupé (10 mg sécable en deux) et écrasé	O	1
Beloc ZOK (métoprolol)	cpr à libér. contrôlée 25, 50, 100 et 200 mg (ZOK zero order kinetics)	Ne pas écraser. Peut être coupé (sécable en deux) et dispersé dans de l'eau	O !	1,2
Betaserc (betahistine)	cpr 8, 16 et 24 mg	Peut être coupé (16 et 24 mg sécables en deux) et écrasé Alternative : gouttes 8 mg/ml	O	1,3
Bextra (valdécoxib)	cpr pelliculé 10, 20 et 40 mg	Peut être écrasé	O	1
Bioflorin (entérocoques)	caps 75 MIO	Peut être ouverte	O	1,5
Brufen (ibuprofène)	cpr filmé 200, 400 et 600 mg	Peut être écrasé Alternatives : granulés effervescents, sirop ou changer de voie d'administration (suppos.)	O	1,5
Brufen Retard (ibuprofène)	cpr filmé 800 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard)	N	1
Buscopan (butylscopolamine)	drag 10 mg	Peut être écrasée	O	1,5
Calcimagon-D3 (calcium / cholecalciferol)	cpr à mâcher ou dissoudre 500 mg C / 400 UI CH	Peut être écrasé ou dissous	O	1
Calcium Acétate (calcium acétate)	cpr 500 mg	Peut être écrasé	O	1,5
Calcium Acétate (calcium acétate)	caps 400 mg	Peut être ouverte	O	1,5
Calcium Carbonate (calcium carbonate)	cpr 500 mg	Peut être écrasé	O	1,5
Calcium Monohydrogénophosph. CHUV (CaHPO ₄)	caps 200 mg	Peut être ouverte	O	1,5

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Casodex (bicalutamide)	cpr pelliculé 50 et 150 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Catapressan (clonidine)	cpr 0.15 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Ceclor Retard (céfaclor)	cpr retard 375, 500 et 750 mg	Ne pas couper, ni écraser Alternative : granulés pour suspension	N	1,5
Cedur Retard (bézafibrate)	drag retard 400 mg	Ne pas couper, ni écraser	N	1
Celebrex (célécoxibe)	caps 100 et 200 mg	Peut être ouverte	O	1,2
Chloraldurat bleu (hydrate de chloral)	caps retard 250 mg	Ne pas ouvrir la caps (perte de l'effet retard) Alternative : Nervifène sirop 100 mg/ml ou Chloral solution rectale 100 mg/ml	N	1
Chloraldurat rouge (hydrate de chloral)	caps 250 et 500 mg	Peut être ouverte (le contenu est liquide). Alternative : Nervifène sirop 100 mg/ml ou Chloral solution rectale 100 mg/ml	O	1
Chlorophylle (chlorophylle)	drag 20 mg	Peut être écrasée ou fondue sous la langue	O	1,5
Cipralex (escitalopram)	cpr pelliculé 5, 10, 15 et 20 mg	Peut être écrasé	O	1,5
Ciproxine (ciprofloxacine)	cpr 250, 500 et 750 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : suspension 50 et 100 mg/ml. Attention : interaction avec les produits laitiers. A administrer loin des repas.	O	1,3
Citalopram Ecosol (citalopram)	cpr filmé 20 et 40 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Clamoxyl RC (amoxicilline)	cpr 375 et 750 mg (RC roller compaction)	Peut être coupé (750 mg sécable en deux) et dissous dans de l'eau Alternatives : suspension 25 et 50 mg/ml	O	1,3
Claritine (loratidine)	cpr 10 mg	Peut être écrasé Alternative : sirop 1mg/ml	O	1,5
Clopixol (zuclopenthixol)	drag enrobée 2, 10, 25 et 40 mg	Peut être écrasée Alternative : gouttes 20 mg/ml	O	1,3
Co-Dafalgan (paracétamol / codeïne)	cpr 500 mg P / 30 mg C	Peut être écrasé Alternative : cpr effervescents sécables	O	1,5
Codéine Streuli (codéine)	cpr 10 et 20 mg	Peut être écrasé Alternative : sirop 2.5 mg/ml (codéine phosphate)	O	1,3
Colchicine CHUV (colchicine)	caps 0.5 mg	Peut être ouverte	O	5
Combivir (lamivudine/zidovudine)	cpr filmé 150 mg L / 300 mg Z	Peut éventuellement être écrasé ; utiliser de préférence 3TC solution buvable 10 mg/ml et Retrovir sirop 10 mg/ml	O	1,4
Comilorid-Mepha (amiloride / hydrochlorothiaz.)	cpr mite 2.5mg A/ 25mg H cpr 5 mg A / 50 mg H,	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Comtan (entocapone)	cpr filmé 200 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Concor (bisoprolol)	cpr laqué 2.5, 5 et 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Cordarone (amiodarone)	cpr mite 100 mg cpr 200 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Co-Reniten (énalapril / hydrochlorothiaz.)	cpr 20 mg E / 12.5 mg H	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé (mais très amer)	O	1-3

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Corvaton (molsidomine)	cpr 2 mg cpr forte 4 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Corvaton Retard (molsidomine)	cpr retard 8 mg	Peut être coupé (sécable en deux) mais ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	N	1,3
Cosaar (losartan)	cpr submite 12.5 mg cpr 50 mg cpr forte 100 mg	Peut être coupé (50 mg sécable en deux) et écrasé (mais très amer)	O	1,3
Cosaar Plus (losartan/ hydrochlorothiaz.)	cpr 50mg L/12.5 mg H cpr forte 100mg L/ 25mg H	Peut être écrasé	O	1,3
Creon (pancréatine)	caps avec micro- granules gastro-rés. 150 mg caps forte 300 mg	Peut être ouverte Ne pas écraser les micro-granules gastro-résistants (Exception : pulvériser les micro-granules pour déboucher une sonde entérale)	O !	1,3
Crixivan (indinavir)	caps 200 et 400 mg	Peut être ouverte ; diluer le contenu de la capsule dans un liquide acide (Coca-Cola)	O	1,3
Cyklokapron (ac. tranexamique)	cpr pelliculé 500 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : cpr effervescent 1000 mg	O	1,3
Dafalgan (paracétamol)	cpr 500 et 1000 mg	Peut être écrasé Alternatives : cpr effervescent (500 et 1000 mg sécables en deux), sirop enfant 30 mg/ml, poudre (enfant), suppositoires, gouttes Becetamol 100 mg/ml	O	1,3
Daflon (diosmine)	cpr enrobé 500 mg	Peut être écrasé	O	1,5
Dalacin-C (clindamycin HCl)	caps 150 et 300 mg	Peut être ouverte (risque d'oesophagite) Alternative : sirop 75 mg/5 ml	O	1,3
Dalmadorm (flurazépam)	cpr mite 15 cpr 30 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Daonil (glibenclamide)	cpr 5 mg Semi-Daonil cpr 2.5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Daraprim (pyriméthamine)	cpr 25 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Deanxit (mélitracène / flupentixol)	drag 10 mg M / 0.5 mg F	Peut être écrasé	O	1,5
Demetrin (prazépam)	cpr 10 et 20 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Depakine Chrono (ac. valproïque)	cpr pelliculé à libér. prolongée 300 et 500 mg	Ne pas écraser, ni disperser dans un liquide Peut être coupé (sécables en deux) Alternative : sirop 60 mg/ml	N	1,3
Deroxat (paroxétine)	cpr pelliculé 20 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : suspension 2 mg/ml	O	1,3
Detrusitol (toltérodine)	cpr 1 et 2 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Detrusitol SR (toltérodine)	caps avec micro- granules retard 4 et 8 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	O !	1,2
Dexamethasone (dexaméthasone)	cpr 1 et 4 mg	Peut être coupé (1 mg sécable en deux, 4 mg sécable en quatre) et écrasé	O	1,3
Diamicron (gliclazide)	cpr 80 mg	Peut être coupé (sécable en quatre), mais ne doit pas être écrasé	N	1,2
Diamicron MR (gliclazide)	cpr à libér. modifiée 30 mg	Ne pas couper, ni écraser	N	1

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Diamox (acétazolamide)	cpr 250 mg	Peut être coupé (sécable en quatre) et écrasé Alternative : Diamox Péd 5 mg/ml CHUV	O	1
Diamox Sustet (acétazolamide)	caps retard 500 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet libération prolongée)	O !	1
Dibenzylan (D) (phénoxybenz.)	cpr 1 mg caps 5 et 10 mg	Le cpr peut être écrasé La caps peut être ouverte	O	2,3, 5
Diflucan (fluconazole)	caps 50, 150 et 150 mg	Peut être ouverte Alternative : suspension 10 et 40 mg/ml	O	1,3
Digoxine (digoxine)	cpr 0.125 et 0.250 mg	Peut être coupé (0.25 mg sécable en deux) et écrasé, mais cela est déconseillé (risque d'erreur de dosage) Alternative : Digoxine Nativelle 50 mcg/ml	O	1
Dihydrocodéinone (hydrocodone tartr.)	cpr 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Dilatrend (carvédilol)	cpr 6.25, 12.5 et 25 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Dilzem (diltiazem)	cpr 60 mg	Peut être coupé (sécable en deux)	N	1,3
Dilzem retard (diltiazem)	cpr filmé retard 90 et 120 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard)	N	1,3
Dilzem RR (diltiazem)	cpr filmés retard 180 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard)	N	1,3
Dilzem 240 Uno (diltiazem)	caps retard 240 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	O !	1,3
Dipiperon (pipampérone)	cpr 40 mg	Peut être coupé (sécable en quatre) et écrasé	O	1,3
Distraneurine (clométhiazol)	caps 300 mg	Ne pas ouvrir la caps Alternative : mixture 50 mg/ml	N	1,3
Ditropan (oxybutynine)	cpr 5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Dormicum (midazolam)	cpr 7.5 et 15 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Dostinex (carbégoline)	cpr 1 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Dulcolax (bisacodyl)	drag 5 mg	Peut être écrasé Alternative : autre voie (suppositoires)	O	1,3
Duofer (fer II / ac. ascorb)	cpr filmé 69 mg F / 300 AA	Ne pas écraser Alternative : Maltofer gouttes 50 mg/ml (fer III)	N	1,3
Duphaston (didrogestérone)	cpr 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Duspatalin Retard (mébévérine)	caps retard 200 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard) Alternative : suspension 10 mg/ml	O !	1
Edronax (réboxétine)	cpr 4 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Efexor (venlafaxine)	cpr 37.5 et 75 mg	Peut être coupé (75 mg sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Efexor ER (venlafaxine)	caps avec micro-granules retard 75 et 150 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	O !	1,5
Effortil Dépôt Perlonguettes (éthyléfrine)	caps retard 25 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard) Alternative : gouttes 7.5 mg/ml	O !	1,5
Eltroxine (lévothyroxine)	cpr 0.05 mg cpr 0.1 mg	Peut être coupé (cpr 0.05 mg sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Enatec (énalapril)	cpr 5, 10 et 15 mg	Peut être coupé en deux (sécable) et écrasé	O	1,3

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Endoxan (cyclophosphamide)	drag 50 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Entumine (clotiapine)	cpr 40 mg	Peut être coupé en deux (sécable) et écrasé	O	1,5
Estracyt (estramustine)	caps 140 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Epanutin (phénytoïne sod.)	caps 50 et 100 mg	Peut être ouverte (faire un suivi des concentrations plasmatiques) Alternative : suspension 6 mg/ml	O	1,3
Epril (énalapril)	cpr submite 5 mg cpr mite 10 mg cpr 20 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Esidrex (hydrochlorothiaz.)	cpr 25 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : suspension Péd. 5 mg/ml CHUV	O	1,3
Fareston (torémifène)	cpr 60 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Farlital (médroxy-progestérone)	cpr 100, 250 et 500 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Femara (létrazol)	cpr filmé 2.5 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Ferro-Gradumet (sulfate de fer)	cpr retard 105 mg (Fe)	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard et irritation des muqueuses) Alternative : Maltofer gouttes 50 mg/ml (fer III)	N	1,3
Flagyl (métronidazole)	cpr filmé 250 et 500 mg	Peut être écrasé Alternative : suspension 25 mg/ml (F)	O	1,3
Florinef (fludrocortisone)	cpr 0.1 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Floxapen (flucloxacilline)	caps 250 et 500 mg	Peut être ouverte	O	1,3
Flucinome (flutamide)	cpr 250 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Fluctine (fluoxétine)	caps 20 mg cpr dispersible 20 mg	La caps peut être ouverte Le cpr peut être coupé (sécable en deux) et dissous dans l'eau Alternative : liquide 20 mg/5 ml	O	1,5
Fludex SR (indapamide)	cpr retard 1.5 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard)	N	1
Fluoxétine Mepha (fluoxétine)	caps 20 mg	Peut être ouverte	O	1,5
Folvite (ac. folique)	cpr 1 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Fosamax (alendronate)	cpr 10 mg cpr hebdom. 70 mg	Avaler le cpr à jeun en position debout avec un grand verre d'eau (irritant pour les muqueuses). Peut être écrasé pour une administration par sonde	O	1,4
Fucidin (ac. fusidique, Na)	cpr 250 mg	Peut être écrasé (goût mauvais)	O	1,2
Glibenese (gliplizide)	cpr 5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Glivec (imatinib mésil.)	cpr 100 et 400 mg	Peut être coupé (100 mg sécable en deux), écrasé et dilué dans un liquide (eau, jus de pomme)	O	1
Glucophage (metformine)	cpr 500, 850 et 1000 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Gutron (midodrine)	cpr 2.5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : gouttes 10 mg/ml	O	1,5
Gynipral (hexoprénaline)	cpr 0.5 mg	Peut être écrasé	O	1,5

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Gyno-Tardyferon (fer III / ac. folique)	drag retard (dépôt) 80 mg F / 0.35 mg AA	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard et irritation des muqueuses)	N	1
Haldol (haloperidol)	cpr 1 et 10 mg	Peut être coupé (1 mg sécable en quatre ; 10 mg en deux) et écrasé Alternative : gouttes 2 et 10 mg/ml	O	1,3
Hydrocortone (hydrocortisone)	cpr 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Pédiatrie : gélules 0.5, 1, 2, 3 mg CHUV	O	1,3
Hygroton (chlortalidone)	cpr 25 et 50 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Imodium (loperamide)	caps 2 mg	Peut être ouverte Alternatives : sirop 0.2 mg/ml ou cpr linguaux 2 mg	O	1,3
Imovane (zopiclone)	cpr 7.5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Imurek (azathioprine)	cpr filmé 25 et 50 mg	Peut être écrasé (port de gants, blouse et masque de protection)	O	1,3
Inderal (propranolol)	cpr 10, 40 et 80 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : Syprol solution 2 mg/ml (UK)	O	1,3
Inderal LA (propranolol)	caps avec micro-granules retard 80 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	O !	1,5
Inderal Retard (propranolol)	caps avec microgran. retard 160 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	O !	1,5
Inhibace (cilazapril)	cpr submite 1 mg cpr mite 2.5 mg cpr 5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Inhibace Plus (cilazapril / hydrochlorothiazide)	cpr pelliculé 5 mg C / 12.5 mg H	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Invirase (saquinavir)	caps 200 mg	Peut être ouverte et mise en suspension dans de l'eau.	O	1,3
Isoket (dinitrate d'isosorbide)	cpr 5, 10 et 20 mg	Administration sublinguale possible. Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé. Peut adhérer aux parois de la sonde.	O !	1,3
Isoket Retard (dinitrate d'isosorbide)	cpr retard 20, 40, 60 et 80 mg caps retard 120 mg	Le cpr peut être coupé (cpr sécable en deux), mais ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard) La caps peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	N O !	1,3
Isoptin (verapamil)	cpr filmé 80 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Isoptin Retard (verapamil)	cpr filmé retard 120 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard)	N	1,3
Isoptin RR Retard (verapamil)	cpr filmé retard 240 mg	Peut être coupé en deux (sécable), mais ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	N	1,3
Kaletra (lopinavir / ritonavir)	caps molles 133 mg L / 33 mg R	Ne pas couper, ni écraser Alternative : Kaletra sirop 80 mg/ml L + 20 mg/ml R Ne pas diluer le sirop avec un autre liquide (risque de précipitation). Si administration par sonde, rincer ensuite avec du lait.	N	1,2
KCL Hausmann Retard (KCl)	drag 10 mmol (K)	Ne pas écraser (perte de l'effet retard) Alternatives : cpr efferv. ou sirop 7,45% CHUV	N	1,3
Keppra (lévétiracéпам)	cpr pelliculé 250, 500 et 1000 mg	Peut être écrasé (l'enrobage masque le goût)	O	1,3
Klacid (clarithromycine)	cpr pelliculé 250 et 500 mg	Peut être écrasé Alternative . Klaciped sirop 25 et 50 mg/ml	O	1,3
Konakion (phytoménadione)	drag à croquer 10 mg	Peut être croquée et écrasée Alternative : solution MM 10 mg/ml	O	1,3
Lamictal (lamotrigine)	cpr à croquer ou déliter 5,25,50,100 et 200 mg	Le cpr peut être croqué ou mis en suspension dans de l'eau	O	1,3

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Lanvis (thioguanine)	cpr 40 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Lasilactone (spironolactone / furosémide)	cpr filmé 50 mg S / 20 mg F 100 mg S / 20 mg F	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Lasix (furosémide)	cpr 40 et 500 mg	Peut être coupé (40 mg sécable en deux, 500 mg sécable en quatre) et écrasé Alternative : Frusol solution 4 mg/ml (UK)	O	1,3
Lasix Long (furosémide)	caps retard 30 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet libération prolongée)	O !	1,3
Leucovorin Ca (folinate calcique)	cpr 15 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Leponex (clozapine)	cpr 25 et 100 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Lexotaniil (bromazepam)	cpr 1.5, 3 et 6 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Liorésal (baclofène)	cpr 10 et 25 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Lisitril (lisinopril)	cpr 5, 10 et 20 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Litalir (hydroxycarbamide)	caps 500 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Lithiofor (lithium sulfate)	cpr retard 660 mg	Peut être coupé (sécable en deux), mais ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	N	1
Lomir SRO (isradipine)	caps retard mite 2.5 mg / caps retard 5 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard). Gonfle avec H ₂ O.	N	1,3
Lopirin (captopril)	cpr 12.5, 25 et 50 mg	Peut être coupé (12.5 mg sécable en deux, 25 et 50 mg en quatre) et écrasé Alternative : Captopril solution 1 mg/ml CHUV	O	1,3
Lopresor (métoprolol)	cpr 50 et 100 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Lopresor Retard (métoprolol)	cpr retard 200 mg (Divitabs)	Le cpr peut être coupé (cpr sécable en deux), mais ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	N	1
Lopresor OROS (métoprolol)	cpr à libér. contrôlée mite 95 mg cpr 190 mg	Ne pas couper, ni écraser (OROS = syst. osmotique oral)	N	1
Ludiomil (maprotiline)	drag 10, 25, 50 et 75 mg	Peut être coupée (75 mg sécable en deux) et écrasée	O	1,3
Madopar (lévodopa / bensérazide)	caps 62.5 et 125 mg cpr 125 et 250 mg	Le cpr peut être coupé (sécable en quatre), mais il faut éviter de l'écraser. Ne pas ouvrir la caps (instabilité du benzérazide). Alternative : LIQ	N	1,3
Madopar LIQ (lévodopa / bensérazide)	cpr soluble 62.5 et 125 mg (62, 5 mg = 50 mg L / 12.5 mg B)	Peut être coupé (sécable en deux) et dissous dans de l'eau	O	1
Madopar DR (lévodopa / bensérazide)	cpr retard 250 mg (Dual Release)	Peut être coupé (sécable en deux), mais ne doit pas être écrasé (perte de l'effet libération double) Alternative : LIQ	N	1
Marcoumar (phenprocoumone)	cpr 3 mg	Peut être coupé (sécable en quatre) et écrasé	O	1,3
Mediaven (naftazone)	cpr 10 mg cpr forte 30 mg	Peut être coupé (10 mg sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Mefenacide (ac. méfénamique)	caps 250 mg cpr 500 mg	La caps peut être ouverte et le cpr écrasé Alternative : Ponstan suspension 10 mg/ml	O	1,5
Mégestat (mégésterol acétate)	cpr 160 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Melleril (thioridazine)	cpr filmé 10, 25 et 50 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Melleril Retard (thioridazine)	cpr retard 30 et 200 mg	Peut être coupé (30 mg sécable en deux ou 200 mg en quatre), mais pas écrasé (perte de l'effet ret)	N	1,3
Mestinon (pyridostigmine)	cpr 10 mg drag 60 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Mestinon Retard (pyridostigmine)	cpr retard 180 mg	Ne pas écraser. Peut être coupé (sécable en deux)	N	1,5
Méthadone (méthadone)	cpr 5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : sirop 2.5 mg/ml CHUV	O	1,3
Methergin (méthylergométrine)	drag 0.125 mg	Peut être écrasée Alternative : gouttes 0.25 mg/ml	O	1,3
Méthotrexate (méthotrexate)	cpr 2.5 et 10 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Metolazone (métolazone)	cpr 5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	5
Minalgin (Métamizole Na)	cpr 500 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : gouttes 500 mg/ml, suppositoires	O	1,3
Moduretic (amiloride / hydrochlorothiaz.)	cpr mite 2.5mg A/ 25mg H cpr 5 mg A / 50 mg H	Peut être coupé (5 mg sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Motilium (dompéridone)	cpr 10 mg	Peut être écrasé. Alternatives : cpr linguaux 10mg, granules efferv. 10 mg, suspension 1mg/ml, ou changer de voie d'administration (suppositoires)	O	1,3
MST Continuous (morphine sulfate)	cpr retard 10, 30, 60, 100 et 200 mg	Ne pas couper, ni écraser Alternative : suspension retard ou Morphine solution 1 mg/ml CHUV	N	1,3
Mucofor (erdostéine)	caps 150, 300 mg	Peut être ouverte Alternative : sachets 300 mg	O	1,5
Myambutol (éthambutol)	cpr filmé 100 et 400 mg	Peut être coupé (400 mg sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Mydocalm (tolpérisone)	drag mite 50 drag 150 mg	Peut être écrasée	O	5
Myleran (busulfan)	cpr enrobé 2 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Mysoline (primidone)	cpr 250 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Navelbine (vinorelbine)	caps molle 20 et 30 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Neo-Mercazole (carbimazole)	cpr 5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Neomycine CHUV (néomycine)	caps 500 mg	Peut être ouverte	O	5
Nexium (ésoméprazole)	cpr avec granules gastro-résistants 20 et 40 mg	Ne pas écraser. Peut être dispersé dans de l'eau ou du jus (garde l'enrobage acido-résistant) Alternative : Oméprazole suspension 2 mg/ml dans NaHCO ₃ 8.4%	O	1,3
Nifédipine Mepha (nifédipine)	caps 5 et 10 mg	Ne pas couper, ni écraser (attention : principe actif photosensible) Alternative : Aprical gouttes 20 mg/ml (D) (sans effet retard !)	N	1,3
Nitroglycérine (nitroglycérine)	caps à croquer 0.8 mg	Ne pas couper, ni écraser	N	1
Nivaquine (chloroquine)	cpr 100 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé (attention : mauvais goût)	O	1,3

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Nolvadex (tamoxifène)	cpr pelliculé 10 et 20 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Noroxin (norfloxacine)	cpr 400 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé (goût très amer). A administrer loin des repas (1 h avant ou 2 h après). Attention : vérifier les interactions!	O	1,5
Norvasc (amlodipine)	cpr 5 et 10 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Norvir (ritonavir)	caps molles 100 mg	Ne pas couper ni écraser Alternative : Norvir sirop 80 mg/ml ; peut être mélangé à du lait chocolat ou du Ensure, mais pas à de l'eau (risque de précipitation).	O	1,4
Nozinan (levomepromazine)	cpr 25 et 100 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : gouttes 40 mg/ml	O	1,3
Orfiril Long (ac. valproïque)	caps avec micro-granules retard 150 et 300 mg minipacks retard 500 et 1000 mg	Peut être ouverte et mélangée à une liquide ou un yaourt, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard) Alternative : sirop 60 mg/ml	O !	1,3
Ospen (phénoxyéthylpénicilline)	cpr filmé 1 et 1.5 MIO UI	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé : Alternative : sirop	O	1,3
Pantozol (pantoprazol)	cpr gastro-résistant 20 et 40 mg	Ne pas couper, ni écraser	N	1,3
Paspertin (métoclopramide)	cpr 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : gouttes 4 mg/ml	O	1,3
Paspertin Retard (métoclopramide)	caps retard 21.1 mg	Peut être ouverte, mais les microgranules ne doivent pas être écrasés. Alternative : gouttes 4 mg/ml	O !	1,3
Perenterol (Saccharomyc. boul.)	caps 250 mg	Peut être ouverte Alternative : sachet 250 mg à diluer	O	1,5
Permax (pergolide)	cpr 0.05, 0.25 et 1 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Petimid (éthosuximide)	cp 250 mg	Ne pas couper, ni ouvrir. Alternative : Zarontin sirop 250mg/5ml (F)	N	1,2
Phenhydan (phénytoïne)	cpr 100 mg	Peut être coupé (sécable en quatre) et écrasé Alternative : suspension Epanutin 6 mg/ml	O	1,3
Phyllotemp Continus (aminophylline)	cpr retard 225 mg	Peut être coupé (sécable en deux), mais ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	N	1,3
Plavix (clopidogrel)	cpr filmé 75 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Plendil (féلودipine)	cpr retard 2.5, 5 et 10 mg	Ne pas couper, ni écraser	N	1
Plitican (alzapride)	cpr 50 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Podomexef (cefepodoxime)	cpr filmé 100 et 200 mg	Peut être écrasé Alternative : granulé pour suspension 8 mg/ml	O	1,5
Ponstan (ac. méfénamique)	caps 250 mg cpr filmé 500 mg	La caps peut être ouverte et le cpr écrasé Alternative : Ponstan suspension 10 mg/ml	O	1,5
Pradif Retard (tamsulosine)	caps retard 0.4 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	O !	1,3
Prava (lomustine)	caps 40 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Praxilène (naftidrofuryl ox.)	cpr 200 mg	Ne pas couper, ni écraser	N	1,3

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Prednisone Galepharma (prednisone)	cpr 5, 20 et 50 mg	Peut être coupé (5 et 20 mg sécables en deux, 50 mg sécable en quatre) et écrasé Alternative : PrednisOLOne –P gouttes 10 mg/ml	O	1,5
Premarin (oestrogènes)	drag 0.625 et 1.25 mg	Peut être écrasée	O	1,3
Prepulsid (cisapride)	cpr 5, 10 et 20 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative: suspension 1 mg/ml	O	1,5
Primperan (métopropramide)	cpr 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternatives : gouttes 2.6 mg/ml ou solution buvable 1 mg/ml, ou changer de voie d'administration (suppositoires)	O	1,3
Procef (cefprozil)	cpr filmé 250 et 500 mg	Peut être écrasé Alternative : suspension 25 et 50 mg/ml	O	1,5
Prograf (tacrolimus)	caps 0.5, 1 et 5 mg	Peut être ouverte (port de gants, blouse et masque de protection). Pour une meilleure absorption, stopper la nutrition entérale 1h avant et après	O	1,3
Puri-Nethol (6-mercaptopurine)	cpr 50 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Pyrazinamide (pyrazinamide)	cpr 500 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	3,5
Quinine sulfate Streuli (id.)	drag 250 mg	Peut être écrasée	O	1,3
Redoxon Retard (ac. ascorbique)	caps retard 500 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard) Alternatives : cpr à sucer ou effervescent	O !	1,5
Remeron (mirtazapine)	cpr enrobé 30 et 45 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : cpr orodispersible 15 et 30 mg	O	1,3
Reminyl (galantamine)	cpr pelliculé 4, 8 et 12 mg	Peut être écrasé	O	1,5
Reniten (énalapril)	cpr submite 5 mg cpr mite 10 mg cpr 20 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé (goût amer)	O	1,3
Requip (ropirinole)	cpr pelliculé 0.25, 1, 2 et 5 mg	Peut être écrasé	O	1,5
Retrovir AZT (zidovudine)	caps 250 mg cpr 300 mg	Ne pas couper, ni écraser Alternative : Retrovir AZT sirop à 10 mg/ml ; le sirop ne doit pas être mélangé à de la nourriture ou d'autres médicaments.	N	1,3
Reyataz (atazanavir)	caps 150 et 200 mg	Peut être ouverte	O	1,5
Rifater (isoniazide/pyrazin/ rifampicine)	drag 50 mg I / 300 mg P / 120 mg R	Peut être écrasée (rifampicine colorée !) Prendre à jeun	O !	1,3
Rifinah (rifampicine /isoniazide)	drag 150 mg R / 100 mg P	Peut être écrasée (rifampicine colorée !) Prendre à jeun	O	1,3
Rimactan (rifampicine)	caps 150 et 300 mg drag 450 et 600 mg	La caps peut être ouverte et la drag écrasée (principe actif coloré !). Prendre à jeun Alternative : suspension 20 mg/ml	O	1,3
Rimifon (isoniazide)	cpr 150 mg	Peut être écrasé Prendre à jeun	O	1,3
Risperdal (rispéridone)	cpr pelliculé 0.5, 1, 2, 3 et 4 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternatives : solution 1 mg/ml ou cpr Quicklet orodispersible 0.5, 1 et 2 mg	O	1,3

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Ritaline (méthylphénydate)	cpr 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Ritaline SR (méthylphénydate)	cpr à libér. prolongée 20 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard)	N	1
Ritaline LA (méthylphénydate)	caps à libér. modifiée 20, 30 et 40 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	O !	1
Rivotril (clonazepam)	cpr 0.5 et 2 mg	Peut être coupé (sécable en quatre) et écrasé Alternative : gouttes 2.5 mg/ml	O	1,3
Rohypnol (flunitrazepam)	cpr enrobé 1 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Sabril (vigabatrin)	cpr pelliculé 500 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : sachets de poudre 500 mg	O	1,3
Sandimmun Neoral (ciclosporine)	caps 10, 25, 50 et 100 mg	Ne pas ouvrir, ni écraser Alternative : solution 100 mg/ml	N	1,3
Saroten Retard (amitriptyline)	caps retard 25 et 50 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	O !	1,3
Selipran (pravastatine)	cpr 10, 20 et 40 mg	Peut être coupé (10 et 20 mg sécables en deux) et écrasé	O	1,3
Seresta (oxazepam)	cpr 15 mg cpr forte 50 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : cpr lingual Expidet 15 mg	O	1,4
Seresta Expidet (oxazepam)	cpr lingual 15 mg	Peut être coupé (sécable en deux) Fond tout seul, sans eau, sur la langue (absorption linguale) ; peut aussi être dispersé dans de l'eau	O	1,4
Seropram (citalopram)	cpr filmé 20 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : gouttes 40 mg/ml	O	1,3
Seroquel (quétiapine)	cpr pelliculés 25, 100, 200 et 300 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Sifrol (pramipexole)	cpr 0.125, 0.25, 0.5 et 1 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Sinemet (carbidopa / lévodopa)	cpr 25 C / 100 mg L 25 C / 250 mg L	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Sinemet CR (carbidopa / lévodopa)	cpr retard 25 C / 100 mg L 50 C / 200 mg L	Peut être coupé (sécable en deux), mais ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	N	1,3
Singulair (montelukast)	cpr filmé 10 mg à mâcher 4 et 5 mg	Peut être écrasé Alternative : sachet granulés 4 mg	O	1,5
Sintrom (acénocoumarol)	cpr mitis 1 mg cpr 4 mg	Peut être coupé (4 mg sécable en quatre) et écrasé (attention aux risques d'erreur de dosage !)	O	1
Sirdalud (tizanidine)	cpr 2 et 4 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Sirdalud MR (tizanidine)	caps retard 6 et 12 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	O !	1,3
Sodium Bicarbonate CHUV	caps 500 et 1000 mg	Peut être ouverte (dégagement de CO ₂ en milieu gastrique)	O	5
Sodium Chlorure CHUV	caps 500 et 1000 mg	Peut être ouverte	O	5
Solian (amisulpride)	cpr 100 et 200 mg cpr filmé 400 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : gouttes 100 mg/ml	O	1,3
Sonata (zaleplone)	caps 5 et 10 mg	Peut être ouverte	O	1,5
Sortis (atorvastatine)	cpr filmé 10, 20 et 40 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Sotalex (sotalol)	cpr 80 et 160 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Stilnox (zolpidem)	cpr pelliculé 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Stocrin (efavirenz)	caps 50, 100, 200 mg cpr filmé 600 mg	Les capsules pourraient être ouvertes Alternative : Stocrin solution buvable 30 mg/ml (Attention : 600 mg d'efavirenz en capsules correspond à 720 mg en solution buvable) ; pour les dosages pédiatriques de la solution, voir le Compendium	O	1,3
Sulfadiazine Streuli (id.)	cpr 500 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Supracyclin (doxycycline)	cpr 100 mg cpr forte 200 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Supradyn (multivitamins)	cpr filmés	Ne pas couper, ni écraser Alternative : cpr effervescent	N	1,5
Surmontil (trimipramine)	cpr 25 et 100 mg	Peut être coupé (25 mg sécable en deux, 100 mg sécable en quatre) et écrasé Alternative : gouttes 40 mg/ml	O	1,3
Symcora (simvastatine)	cpr 20, 40 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Symmetrel (amantadine)	caps 100 mg	Ne pas couper, ni écraser Alternative : PK-Merz cpr	N	1,3
Tamiflu (oseltamivir)	caps 75 mg	Peut être ouverte Alternative : poudre pour suspension orale	O	1,5
Tamoxifène (tamoxifène)	cpr 10 et 20 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Tardyferon (fer II, sulfate)	drag retard 80 mg	Ne pas couper, ni écraser Alternative : Maltofer gouttes 50 mg/ml (fer III)	N	1,3
Tavanic (levofloxacin)	cpr pelliculé 250 et 500 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Tavegyl (clemastine)	cpr 1 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : sirop 0.05 mg/ml	O	1,3
Tegretol (carmamazépine)	cpr 200 et 400 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : sirop 100 mg/5 ml	O	1,3
Tegretol CR (carmamazépine)	cpr à libér. contrôlée (Divitabs, CR controlled release) 200 et 400 mg	Peut être coupé (sécable en deux), mais ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard) Alternative : sirop 100 mg/5 ml	N	1,3
Temesta (lorazepam)	cpr 1 et 2.5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : cpr lingual (Expidet)	O	1,4
Temesta Expidet (lorazepam)	cpr lingual 1 et 2.5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) Fond tout seul, sans eau, sur la langue (absorption linguale); peut aussi être dispersé dans de l'eau	O	1,4
Temodal (témozolomide)	caps 5, 20, 100 et 250 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Tenormin (aténolol)	cpr submite 25 mg cpr mite 50 mg cpr 100 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Tiatral SR (ac. acétylosalicyl.)	cpr à libér. prolongée 100 mg	Ne pas couper, ni écraser	N	1
Timonil (carmamazépine)	cpr 200 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : sirop 20 mg/ml	O	1,3
Timonil Retard (carmamazépine)	cpr retard 200, 300, 400 et 600 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et dispersé dans un liquide, mais pas écrasé Alternative : sirop 100 mg/5 ml	N	1,3
Tolvon (miansérine)	cpr 30 et 60 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Topamax (topiramate)	caps 15 et 50 mg cpr 25, 50, 100 et 200 mg	La caps peut être ouverte Le cpr peut être écrasé	O	1,5
Tora-Dol (kétorolac tromét.)	cpr 10 mg	Peut être écrasé	O	1,5
Torecan (thiéthylpérazine)	drag 6.5 mg	Peut être écrasée	O	1,5
Torem (torasémide)	cpr 2.5, 5, 10 et 200 mg	Peut être coupé (5 et 10 mg sécables en deux, 200 mg sécable en quatre) et écrasé	O	1,3
Tramal (tramadol)	caps 50 mg	Peut être ouverte Alternatives : gouttes 100 mg/ml ou changer de voie (suppositoires)	O	1,3
Tramal Retard (tramadol)	cpr pelliculé retard 100, 150 et 200 mg	Ne pas couper, ni écraser Alternatives : gouttes 100 mg/ml ou changer de voie (suppositoires)	N	1,3
Trandate (labétalol)	cpr pelliculé 100 et 200 mg	Peut être écrasé	O	1,5
Tranxilium (clorazépate)	caps 5, 10 et 20 mg cpr pellic. 20 et 50 mg	La caps peut être ouverte. Le cpr peut être coupé (sécable en quatre) et écrasé	O	1,5
Trental (pentoxifylline)	cpr à libér. retardée 400 mg	Ne pas couper, ni écraser	N	1,3
Trileptal (oxcarbazépine)	cpr filmé 150, 300 et 600 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : suspension 60 mg/ml	O	1,3
Trittico (trazodone)	cpr 50 et 100 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Trizivir (lamivudine / zidovudine / abacavir)	cpr filmé 150 mg L / 300 mg Z / 300 mg A	Peut éventuellement être écrasé ; utiliser de préférence 3TC solution buvable 10 mg/ml, Retrovir sirop 10 mg/ml et Ziagen solution buvable 20 mg/ml	O	1,5
Truxal (chlorprothixène)	cpr pelliculé 15 et 50 mg	Peut être coupé et écrasé	O	1,3
Truxaletten (chlorprothixène)	cpr pelliculé 5 mg	Peut être coupé et écrasé	O	1,3
Unifyl Continus (théophylline)	cpr retard 200, 400 et 600 mg	Peut être coupé (sécable en deux), mais ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard)	N	1
Urbanyl (clobazam)	cpr 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,5
Urispas (flavoxate)	drag 200 mg	Peut être écrasée (dragées dures)	O	1,4
Uromitexan (mesna)	cpr pelliculé 400 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Ursofalk (ac. ursodéoxy- cholique)	caps 250 mg	Peut être ouverte Alternative : suspension 50 mg/ml	O	1,3
Uvamine Retard (nitrofurantoïne)	caps avec microgran. retard 100 mg	Peut être ouverte, mais le contenu ne doit pas être écrasé (perte de l'effet retard) Alternative : Urodin gouttes 90 mg/ml	O !	1
Valcyte (valganciclovir)	cpr pelliculé 450 mg	Peut être écrasé (port de gants, blouse et masque de protection)	O	1,6
Valium (diazépan)	cpr 2, 5 et 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Valtrex (valaciclovir)	cpr enrobé 250 et 500 mg	Peut être écrasé (produit amer)	O	1,3
Venoruton (oxérutine)	caps 300 mg, cpr forte 500 mg	La caps peut être ouverte et le cpr écrasé Alternatives : sachet ou cpr efferv. 1000 mg	O	1,5

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Vepesid (étoposide)	caps 50 et 100 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Vermox (mébendazole)	cpr 100 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Vesanoïd (tretinoïne)	caps 10 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Vfend (voriconazole)	cpr pelliculé 50 et 200 mg	Peut être écrasé	O	1,5
Videx EC (didanosine)	caps 125, 200, 250, 400 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'enrobage gastro-résistant ⇒ perte de l'efficacité) Alternative : Videx suspension 10 mg/ml (à partir de Videx poudre pour suspension 2 gr (F))	N	1,3
Viracept (nelfinavir)	cpr pelliculé 250 mg	Peut être écrasé Alternative : Viracept poudre pour administration orale 50 mg/gr de poudre ; cette poudre peut être mélangée à de l'eau ou du lait. Pour des raisons de goût, éviter les jus acides (pomme, orange, ...).	O	1,3
Viramune (névirapine)	cpr 200 mg	Peut être coupé et écrasé Alternative : Viramune suspension 10 mg/ml (D)	O	1,3
Viread (tenofovir)	cpr filmé 245 mg	Peut être délité dans 100 ml d'eau, de jus d'orange ou de raisin.	O	1
Vitamine B2 (riboflavine)	drag 10 mg	Peut être écrasée	O	1,3
Vitamine B6 (pyridoxine HCl)	cpr 40 et 300 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Voltarène (diclofénac)	drag gastro-résistante 25 et 50 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de la gastro-résistance) Alternatives : cpr dispersible ou gouttes 15 mg/ml, ou changer de voie d'administration (supp.)	N	1
Voltarène Retard (diclofénac)	drag retard 75 et 100 mg	Ne pas couper, ni écraser (perte de l'effet retard) Alternatives : cpr dispersible ou gouttes, ou changer de voie d'administration (suppositoires)	N	1
Voltarène Dispersible (diclofénac)	cpr dispersible 50 mg	Peut être coupé et dissous dans de l'eau Alternatives : gouttes, ou changer de voie d'administration (suppositoires)	O	1
Voltarène Rapide (diclofénac)	drag 50 mg	Eviter de couper ou écraser Alternative : cpr dispersible ou gouttes	N	1
Xanax (alprazolam)	cpr 0.25, 0,5, 1 et 2 mg	Peut être coupé (0.25, 0.5 et 1 mg sécables en deux, 2 mg sécable en quatre) et écrasé	O	1,4
Xanax Retard (alprazolam)	cpr retard 0.5, 1, 2 et 3 mg	Ne pas écraser	N	1
Xatral (alfuzosine)	cpr pelliculé 2.5 mg	Peut être écrasé	O	1
Xatral Uno (alfuzosine)	cpr retard à triple couche 10 mg	Ne pas écraser	N	1
Xeloda (capécitabine)	cpr pelliculé 150 et 500 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Xyzal (lévocétirizine)	cpr pelliculé 5 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : gouttes 5 mg/ml	O	1
Zaldiar (tramadol / paracétamol)	cpr 37.5 mg T et 325mg P	Peut être écrasé Alternative : Tramal goutte 100 mg/ml et Becetamol goutte 100 mg/ml	O	1,3
Zantic (ranitidine)	cpr 150 et 300 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé (cpr très dur et substance amère) Alternative : cpr efferv. ou sachets 150 et 300 mg, Zantac sirop 15 mg/ml ou Ranitidine Ped 5 mg/ml	O	1,3

Nom (dci)	Présentation	Couper, écraser, ouvrir, remarques	SE	Réf
Zavedos (idarubicine)	caps 5, 10 et 25 mg	Cytostatique : contacter le Service de pharmacie		
Zentel (albendazole)	cpr à croquer 400 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : suspension 40 mg/ml	O	1,3
Zerit (stavudine)	caps 15, 20, 30, 40 mg	Peut être ouverte et le contenu mélangé à de l'eau ou un repas Alternative : Zerit poudre pour solution 200 mg, à reconstituer avec 202 ml d'eau (D)	O	1,3
Zestoretic (lisinopril / hydrochlorothiazide)	cpr 20 mg L / 12.5 mg H 10 mg L / 12.5 mg H	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Zestril (lisinopril)	cpr 5, 10, 20 et 30 mg	Peut être coupé (cpr 5 et 20 mg sécables en deux) et écrasé	O	1,3
Ziagen (abacavir)	cpr filmé 300 mg	Ne pas couper, ni écraser Alternative : Ziagen solution buvable 20 mg/ml	N	1,3
Zinat (cefuroxime)	cpr filmé 125, 250 et 500 mg	Peut être écrasé Alternative : suspension 25 mg/ml	O	1,3
Zithromax (azithromycine)	cpr filmé 250 mg	Peut être écrasé Alternative : suspension 40 mg/ml ou sachets	O	1,5
Zocor (simvastatine)	cpr 20, 40 et 80 mg	Peut être coupé (20 mg sécable en deux) et écrasé (20, 40 et 80 mg)	O	1,3
Zofran (ondansétron)	cpr filmé 4 et 8 mg	Peut être écrasé Alternatives : sirop 4 mg/5 ml ou cpr oro-dispersible Zydis 4 et 8 mg	O	1,3
Zoloft (sertraline)	cpr pelliculé 50 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : concentré oral 20 mg/ml	O	1,3
Zovirax (acyclovir)	cpr dispersible 200, 400 et 800 mg	Peut être dissous dans de l'eau Alternative : 80 mg/ml	O	1,3
Zyloric (allopurinol)	cpr 100 et 300 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé	O	1,3
Zyprexa (olanzapine)	cpr filmé 2.5, 5, 10, 15 et 20 mg	Peut être écrasé	O	1,3
Zyprexa Velotab (olanzapine)	cpr orodispersible 5, 10, 15 et 20 mg	Ne pas écraser : fond dans la bouche Peut être dissous dans de l'eau ou une autre boisson (jus d'orange, jus de pomme, lait)	O	1,3
Zyrtec (cetirizine)	cpr pelliculé 10 mg	Peut être coupé (sécable en deux) et écrasé Alternative : gouttes 10 mg/ml	O	1,3
Zyvoxid (linézolide)	cpr filmé 600 mg	Peut être écrasé Alternative : suspension 20 mg/ml	O	1,4

Références :

- 1 Compendium suisse des médicaments 2004. <http://www.documed.ch/> et E-Mediat. <http://www.pharmavista.ch/> (consultés en juillet et août 2004).
- 2 Informations écrites ou téléphoniques obtenues auprès des fabricants.
- 3 Pharmatrix. Universitätsapotheke Tübingen. <http://www.pharmatrix.de> (consulté en juillet 2004).
- 4 Bulletin d'information du CAPP n° 26, Pharmacie des Hôpitaux Universitaires de Genève. 2003 (mise à jour 2004).
- 5 Déduction de la forme galénique et du principe actif.
- 6 Fichier Q/R du Service de pharmacie du CHUV.

Rédaction :

CN / PHA / CHUV / 09.2000 v. 1 (119 médicaments)

EDP / PHA / CHUV / 12.2004 v. 2 (369 médicaments) Validation PV-SD-GP-VD