

ETAT FEBRILE BÉBÉ moins de 3 mois (TRI 1-2)

Médecin

Installation Box Déchoc
Déshabiller + lampe chauffante
Paramètres: FC, FR, T°
Monitoring
Poids
Graphique de surveillance
Score McCarthy

Neurologiques: AVPU: Altération de l'état de conscience,
Fontanelle bombée, Algique, Motricité spontanée diminuée
Respiratoire: Dyspnée, apnée, Cyanose
Circulatoire: Marbrures, Déshydratation sévère,
Temps de coloration augmenté
Général: Score McCarthy ≥ 10 , Pétéchies

O2 à 100% si besoin
Fébrifuge: Paracétamol
Préparer Voie veineuse périphérique (si nécessaire)
Préparer Glucose 30% PO 2 minutes avant acte douloureux;
Nouveau-né de 2.5 à 3kg: 1 ml
Nouveau-né de plus de 3 kg: 2 ml ((renouveler après 5 minutes)
Préparation matériel pour bilan infectieux:
-- Sanguin: FSC, CRP, Hémocultures, +/- gazométrie
-- Sondage urinaire pour Stix et Uricult
-- Ponction lombaire (pour bébés < 1 mois) (> 1 mois selon la clinique)
Rassurance des parents et leur laisser le choix de sortir ou non lors des actes douloureux

TRAITEMENT/OM
ATB IV
Perfusion entretien/OM

Conseils

CHU

Hospitalisation

ETAT FEBRILE ENFANT plus de 3 mois (TRI 3-4)

Installation Box Déchoc
Déshabiller complètement
Paramètres: FC, FR, satu, TA, T°
Monitoring
Position confort de l'enfant
Poids
Graphique de surveillance
Score McCarthy (0-2 ans)

Cutané: Pétéchies

Neurologique: AVPU: Altération de l'état de conscience, Irritabilité, Céphalée, Fontanelle bombée

Circulatoire: Marbrures, Augmentation du temps de coloration

NON

C.f. fiche correspondante selon autres symptômes

Respiratoire: Dyspnée, Grunting, Tachypnée

Circulatoire: Marbrures, Augmentation du temps de coloration,

NON

C.f. Détresse respiratoire TRI 3

Digestifs: Douleur abdominale, Vomissements, Diarrhée,

Post-opératoire digestif

Circulatoire: Marbrures, Augmentation du temps de coloration

NON

C.f. Douleurs abdominales TRI 3-4

Médecin