

TRAUMATISME D'UN MEMBRE AVEC DEFORMATION (TRI 2)

Installation Box Consultation
Paramètres: FC, FR, TA, T°,
Satu en continu sur le membre atteint
Évaluation de la douleur
Poids
Graphique de surveillance

Morphine PO ≥ 1 an
Si voie veineuse en place, donner Morphine IV
(sur OM)
Pose EMLA

Déformation du membre
Absence de pouls
Trouble de sensibilité
État hémodynamique:
pâleur
tachycardie

Médecin

Immobilisation de confort
Glace
Attendre au minimum 15 mn avant de mettre sur civière
+ radiologie
SI FRACTURE FÉMUR: - Pose voie veineuse AVANT radio
(qui se fait aux urgences)
ET envisager bloc fémoral: Appeler anesthésiste

TRAITEMENT/OM (si enfant < 1 an, appeler médecin avant de donner la morphine!!!)

Antalgie Palier 3: Morphine IV

DOSE DE CHARGE:

Morphine IV: 0,1 mg/kg/dose

Si pas soulagement après 10min.:

Morphine: 0,05 mg/kg/dose et à répéter (SUR OM)

Ne pas dépasser 0,2mg/kg (charge + doses supplémentaires)

Antalgie Palier 1 immédiatement après morphine si non nauséux

Paracétamol: 20 mg/kg/dose PO ou Rectal (dose max. 1000 mg/dose)

Ibuprofène: 10mg/kg/dose PO ou Rectal (dose max. 400 mg/dose)

MORPHINE: CONTRE-INDICATIONS:

+ Troubles de l'état de conscience

+ Traumatisme crânien
ou abdominal associé

+ Prise préalable d'opiacés
ou benzodiazépines

Médecin

Pose voie veineuse
Préparation pré-op

Évaluation globale
après retour de radiologie

TRAITEMENT/OM
ATB si plaie ouverte

Hospitalisation