

Blépharoplastie

(Correction de l'excès cutané des paupières)

1 Description

Excision de l'excès de peau de la paupière supérieure et/ou inférieure qui peut être associée au retrait des poches de graisse palpébrale au niveau des paupières inférieures dans le but d'alléger le regard.

2 Type d'anesthésie

Anesthésie locale ou anesthésie locale avec sédation légère.

3 Durée de l'intervention

Variable de 40 minutes à 2 heures.

4 Séjour à l'hôpital

Ambulatoire pour paupières supérieures, hôpital de jour pour paupières inférieures ou 4 paupières.

5 Incapacité de travailler

1 semaine pour un travail de bureau; 2 semaines pour un travail impliquant un effort physique plus important. La délivrance d'un certificat médical N'EST PAS autorisée dans les cas à visée strictement esthétique.

6 Retour à la vie sociale

5-7 jours. Un gonflement important peut être présent dans les jours suivants l'intervention, associé à des ecchymoses autour des yeux.

7 Précautions et consignes après l'opération

Les soins corporels peuvent être effectués dès le jour de l'opération. Présence de petits pansements sur les incisions chirurgicales autour des yeux (paupières supérieures). Éviter d'être trop couché.e les premiers jours après l'opération. Fils fin non-résorbables à retirer environ 5-7 jours après l'intervention.

8 Varia

Application de sachet type « cold pack » autour des yeux et administration d'Arnica (globules) peut aider les premiers jours après l'opération.