

Brachioplastie

(Redrapage cutané des bras)

1 Description

Ablation de l'excès de peau et de tissu adipeux des bras, à la suite d'une perte de poids importante.

2 Type d'anesthésie

Anesthésie générale.

3 Durée de l'intervention

Variable entre 1,5 et 2 heures, selon la quantité de tissu à retirer.

4 Séjour à l'hôpital

Si brachioplastie seule, en ambulatoire, si associée à autre intervention, la longueur du séjour varie en fonction de l'ampleur des chirurgies.

5 Incapacité de travailler

Environ 2 semaines pour un travail de bureau, 6 semaines pour un travail nécessitant un effort physique plus important. La délivrance d'un certificat médical N'EST PAS autorisée dans les cas à visée strictement esthétique.

6 Retour à la vie sociale

Immédiatement après l'intervention.

7 Précautions et consignes après l'opération

Les soins corporels peuvent être effectués dès le premier jour post-opératoire, après retrait des drains (si présents), douche incluse. Il suffit de sécher les pansements avec un sèche-cheveux.

Les mouvements et efforts sont limités aux douleurs. Après l'intervention chirurgicale, un boléro (sorte de manche compressive) - d'habitude à acquérir par la patiente avant l'opération - devra être porté pendant environ 4-6 semaines: 24 heures sur 24 pendant les 2 premières semaines, uniquement en journée durant les 2-4 semaines suivantes.

8 Varia

Afin d'optimiser les coûts de prise en charge par l'assurance maladie et de réduire le nombre d'interventions, la brachioplastie peut être réalisée au cours de la même séance opératoire d'une intervention prise en charge par la caisse maladie. Elle peut être associée par ex. à une abdominoplastie et une liposuction.