

Lifting frontal, facial, et cervical

1 Description

Redrapage de la peau dans les zones relâchées du visage et du cou, dans le but de rajeunir la forme du visage. Peut être associée à une blépharoplastie (chirurgie des paupières) et/ou à un lifting du front et/ou du cou.

2 Type d'anesthésie

Anesthésie générale.

3 Durée de l'intervention

Variable entre 2 et 4 heures selon le nombre de zones concernées.

4 Séjour à l'hôpital

1 à 2 jours.

5 Incapacité de travailler

1 à 2 semaines pour un travail de bureau; 4 semaines pour un travail nécessitant un effort physique important ou dans des environnements poussiéreux. La délivrance d'un certificat médical N'EST PAS autorisée en cas d'intervention purement esthétique.

6 Retour à la vie sociale

7 à 10 jours. Un gonflement notable peut être présent dans les jours suivant l'intervention.

7 Précautions et consignes après l'opération

Les soins corporels peuvent être effectués dès le premier jour post-opératoire. Présence de petits pansements sur les incisions chirurgicales autour des oreilles. Éviter d'être trop couché.e les premiers jours après l'opération. Fils fin non-résorbables à retirer environ 5-7 jours après l'intervention.

8 Varia

Application de sachet type « cold pack » autour de la face et administration d'Arnica (globules) peut aider les premiers jours après l'opération.