

Greffe de ganglions lymphatiques et/ou déviation lympho-veineuse pour le traitement d'un lymphœdème chronique

1 Description

Le lymphœdème est caractérisé par une accumulation excessive de lymphes dans la peau et les tissus sous-cutanés, principalement des membres. Le lymphœdème peut apparaître sans cause connue (lymphœdème primaire) ou à la suite d'une chirurgie des ganglions, d'une radiothérapie pour un cancer (par exemple, après le traitement d'un cancer du sein) et/ou une infection (lymphœdème secondaire).

Le traitement de base repose sur la thérapie compressive à l'aide de manchons ou de bas de contention et sur le drainage lymphatique manuel. Dans certains cas, un traitement chirurgical peut améliorer le stade du lymphœdème. Selon la gravité et la cause du lymphœdème, on peut recourir à une liposuction comme intervention unique ou à des techniques microchirurgicales comme des anastomoses pour brancher les veines aux vaisseaux lymphatiques sous la peau, ou comme le transfert de ganglions lymphatiques.

Les ganglions sont en général prélevés au niveau de l'aisselle, de l'aîne ou du ventre (omentum).

2 Type d'anesthésie

Anesthésie générale.

3 Durée de l'intervention

Variable de 2 à 4 heures.

4 Séjour à l'hôpital

2 à 4 jours.

5 Incapacité de travailler

2 à 4 semaines pour un travail de bureau; 6 semaines pour un travail nécessitant un effort physique important.

6 Retour à la vie sociale

10 à 15 jours.

7 Précautions et consignes après l'opération

Les soins corporels peuvent être effectués dès le premier jour post-opératoire, après retrait des drains (si présents), douche incluse. Il suffit de sécher les pansements avec un sèche-cheveux. Les mouvements et efforts sont limités aux douleurs.

Après l'intervention, et dès que les plaies le permettent, un manchon compressif ou un bas compressif devra être porté en continu comme avant l'opération pendant une période variable, avec le but de réduire le grade et les heures de compression.

Les mouvements sont limités aux douleurs et le drainage lymphatique est réinitié dès les premiers jours après l'opération (sauf au niveau des régions directement touchées par l'opération), les ménageant pendant environ 2 semaines.