

Correction des malformations congénitales du sein

1 Description

Correction des altérations de la forme et/ou du volume des seins présentes depuis la naissance (par exemple « sein tubéreux ») ou provoquées par des traumatismes/interventions chirurgicales. Ce type d'intervention peut également impliquer l'utilisation de prothèses mammaires ainsi que de greffe de graisse autologue (« lipofilling »).

2 Type d'anesthésie

Anesthésie générale.

3 Durée de l'intervention

Variable de 1,5 à 4 heures.

4 Séjour à l'hôpital

3 à 4 jours ; pour certaines indications, faisables en ambulatoire.

5 Incapacité de travailler

1 à 2 semaines pour un travail de bureau ; 4 à 6 semaines pour un travail nécessitant un effort physique important, si intervention sans implants; 4 à 6 semaines pour un travail nécessitant un effort physique important. La remise d'un certificat médical N'EST PAS autorisée dans les cas à visée strictement esthétique, c'est-à-dire sans garantie de prise en charge par l'assurance maladie.

6 Retour à la vie sociale

Immédiatement après l'intervention.

7 Précautions et consignes après l'opération

Les soins corporels peuvent être effectués dès le premier jour post-opératoire, après retrait des drains (si présents), douche incluse. Il suffit de sécher les pansements avec un sèche-cheveux.

Les mouvements et efforts sont limités aux douleurs. En cas d'implants, il est conseillé de ne pas trop lever les bras au-dessus de la tête pendant les 4-6 semaines après l'intervention.

Après l'intervention chirurgicale, un soutien-gorge compressif - d'habitude remis à la patiente pendant le séjour à l'hôpital - devra être porté pendant environ 6 semaines: 24 heures sur 24 pendant les 2 premières semaines, uniquement en journée durant les 4 semaines suivantes.

En cas de lipofilling associé, une gaine compressive sera portée 6 semaines sur la zone de prélèvement.