

Reconstruction oncoplastique après tumorectomie

1 Description

Il s'agit d'un remodelage du tissu glandulaire résiduel après tumorectomie de la partie du sein atteint par une tumeur, incluant si nécessaire de la peau. Un large éventail de techniques de chirurgie plastique, permet de donner une nouvelle forme harmonieuse au sein.

Vu que le sein remodelé aura un volume inférieur au volume d'origine, une réduction mammaire de symétrisation du sein controlatéral est souvent réalisée lors de la même intervention. Cela permet d'obtenir une symétrie immédiate et du volume et de la forme des deux seins après l'opération.

2 Type d'anesthésie

Anesthésie générale.

3 Durée de l'intervention

Variable de 2 à 4,5 heures incluant la tumorectomie, les analyses histopathologiques intra-opératoire et la chirurgie des ganglions lymphatiques au niveau de l'aisselle, si nécessaire et s'il s'agit d'une chirurgie unilatérale ou bilatérale, c'est à dire une chirurgie de symétrisation du sein controlatérale est réalisée en parallèle ou pas.

4 Séjour à l'hôpital

3-4 jours.

5 Incapacité de travailler

1 à 2 semaines pour un travail de bureau; 4 à 6 semaines pour un travail nécessitant un effort physique important. La remise d'un certificat médical N'EST PAS autorisée dans les cas à visée strictement esthétique, c'est-à-dire sans garantie de prise en charge par l'assurance maladie.

6 Retour à la vie sociale

7 à 10 jours.

7 Précautions et consignes après l'opération

Les soins corporels peuvent être effectués dès le premier jour post-opératoire, après retrait des drains (si présents), douche incluse. Il suffit de sécher les pansements avec un sèche-cheveux.

Les mouvements et efforts sont limités aux douleurs.

Après l'intervention chirurgicale, un soutien-gorge compressif - d'habitude remis à la patiente pendant le séjour à l'hôpital - devra être porté pendant environ 6 semaines: 24 heures sur 24 pendant les 2 premières semaines, uniquement en journée durant les 4 semaines suivantes.