

Reconstruction après exérèse de tumeurs cutanées et de sarcomes des tissus mous

1 Description

Reconstruction de la perte de substance des tissus mous (peau > muscle) par greffe de peau, lambeau local et/ou lambeau microvasculaire, touchant plusieurs régions du corps avec des techniques adaptées à chaque cas, après preuve histopathologique de l'excision radicale de la tumeur.

Ce type de traitement est réalisé en étroite collaboration avec les services de dermatologie, d'oncologie et d'orthopédie. Le suivi oncologique post-opératoire est assuré par les médecins et/ou les services qui ont référé les patients.

2 Type d'anesthésie

Anesthésie locale ou générale selon la complexité de l'opération, ainsi que la localisation et l'étendue de la perte de substance.

3 Durée de l'intervention

Variable entre 30 minutes à 4 heures.

4 Séjour à l'hôpital

Variable en fonction de la complexité du cas (milieu ambulatoire ou en hospitalisation).

5 Incapacité de travailler

2 semaines pour un travail de bureau; jusqu'à 6 semaines pour un travail nécessitant un effort physique important.

6 Retour à la vie sociale

5 à 7 jours.

7 Précautions et consignes après l'opération

Les soins corporels peuvent être effectués dès le premier jour post-opératoire, après retrait des drains (si présents), douche incluse. Il suffit de sécher les pansements avec un sèche-cheveux.

Après l'intervention et selon les plaies (par exemple, site donneur de la greffe de peau), des soins de plaies particuliers peuvent être nécessaires dans les cas les plus complexes. Les mouvements et les efforts sont limités aux douleurs.