

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Dans les structures relevant de l'Office du soutien pédagogique et de l'enseignement spécialisé (OSPES) du canton de Vaud, l'administration d'un médicament est autorisée si :

- La personne qui administre le médicament est compétente. (voir la liste de délégation des soins).
- Le document « Délégation pour l'administration des médicaments » est signé par l.e.a responsable légal.e et un.e infirmier.ère / ASSC.
- Les copies des ordonnances médicales sont transmises au référent-e de l'enfant.

Pour administrer un médicament en toute sécurité :

- La personne qui prépare le médicament est la personne qui administre le médicament
- Se laver ou/et se désinfecter les mains
- Préparer le médicament selon les indications du document « Délégation pour l'administration des médicaments » ou selon la copie de l'ordonnance médicale
- **Administer le médicament selon la règle des 6B :**
 - 1) Le bon médicament
 - 2) À la bonne personne
 - 3) Au bon moment
 - 4) À la bonne dose
 - 5) Par la bonne voie
 - 6) De la bonne façon
- Demander un double contrôle à un collègue si un doute persiste. Le double contrôle est obligatoire pour un stupéfiant.
- S'assurer que le médicament a bien été pris par l'enfant
- Signer le document « Fiche nominative d'administration des médicaments »



IL EXISTE DES MEDICAMENTS AVEC LE MÊME NOM CONTENANT UNE CONCENTRATION DIFFERENTE

Établi par Floriane Hentzler, Infirmière, Unité d'Accueil Temporaire la Carène
Revu par Mme M.-J. Quaglia, infirmière référente qualité, équipe soins et soutien du CHUV, août 2021
Revu par Ermindo Di Paolo, pharmacien CHUV, août 2021
Revu par Ermindo Di Paolo, pharmacien CHUV oct. 2023

Tiré du site intranet de la pharmacie du CHUV, Refmed
et du compendium : www.compendium.ch

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Répertoire des médicaments par ordre alphabétique : (lien par clic sur le nom)

Page 7	<u>Abilify® sirop 1mg/ml ou Abilify® 5mg comprimé (Aripiprazole)</u>
Page 8	<u>Acétalgine® (paracétamol) => voir Dafalgan®</u>
Page 9	<u>Aerius® 0.5mg/ml solution ou 5mg comprimé filmé (Desloratadine)</u>
Page 10	<u>Aldactone® comprimé filmé 25mg ou 50mg ou 100mg (spironolactone)</u>
Page 11	<u>Algifor Dolo forte® 200mg/5ml ou Algifor Dolo Junior® 100mg/5ml ou Algifor Junior® 100mg/5ml (Ibuprofène)</u>
Page 12	<u>Amoxi-Mepha® 200m/4ml suspension ou Amoxi-Mepha® 50mg/1ml (amoxicilline)</u>
Page 13	<u>Apydan Extent® 150mg ou 300mg ou 600 mg comprimé (Oxcarbazépine)</u>
Page 14	<u>Aripiprazole® → voir Abilify®</u>
Page 14	<u>Atarax® sirop 2mg/1ml et Atarax® comprimé Filmé 25mg (Hydroxyzine)</u>
Page 15	<u>Axotide® aérosol 50 mcg ou 125 mcg ou 250 mcg (fluticasone) (mcg=microgramme)</u>
Page 16	<u>Azathioprin® (= Imurek) suspension 5mg/ml ou 25mg/ml /comprimé filmé 25mg ou 50 mg</u>
Page 17	<u>Baclofen® sirop → voir Lioréal®</u>
Page 17	<u>Ben-u-ron® sirop 200mg/5ml, comprimé 500mg ou 1000mg, suppo. 125mg ou 250mg ou 500mg (paracétamol)</u>
Page 18	<u>Betnesol® comprimé orodisp. 0,5mg (Bétaméthasone)</u>
Page 19	<u>Bioflorin® 75 moi UI capsule (microorganismes produisant de l'acide lactique)</u>
Page 20	<u>Broncho-Vaxom® sachets</u>
Page 21	<u>Bulboïd® 878 mg ou 1756 mg (glycérol)</u>
Page 22	<u>Calcimagon-D3® (Calcium vit D3)</u>
Page 23	<u>Calmerphan-L® sirop (dextromethorphan)</u>
Page 24	<u>Carbolevure® capsule (Charbon médicinal en association)</u>
Page 25	<u>Carnitene® sirop 300mg/ml (lévocarnitine)</u>
Page 26	<u>Cetallerg® comprimé filmé 10 mg (cétirizine)</u>
Page 27	<u>Cevanel® → voir Cerazette® comprimé filmé (désogestrel)</u>
Page 28	<u>Chlorprothixène → voir Truxal®</u>
Page 28	<u>Ciproxin HC® suspension</u>
Page 29	<u>Circadin® 2 mg → voir Mélatonine</u>
Page 29	<u>Cisapride 1mg/ml suspension (= Prepulsid)</u>

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Page 30	<u>Clarithrocine Mepha® suspension 25mg/ml ou 50mg/ml (clarithromycine)</u>
Page 31	<u>Co-Amoxi® suspension 156.25 Mepha (31.25mg/ml) ou 312.5 Mepha (62.5mg/ml) ou 457 Mepha (91.4mg/ml) (amoxicilline + acide clavulanique)</u>
Page 32	<u>CollunosoL-N® (Chlorhexidine, lidocaïne)</u>
Page 33	<u>Concerta® comprimé retard 18 mg ou 27mg ou 36mg ou 54mg (méthylphénidate) STUPEFIANT</u>
Page 34	<u>Dafalgan® comprimés 500mg (paracétamol)</u>
Page 35	<u>Dafalgan® sirop 30mg/ml (paracétamol)</u>
Page 36	<u>Dafalgan® suppositoire 80mg, 150mg, 300mg, 600mg (paracétamol)</u>
Page 37	<u>Diazepam Mepha® rectal 5mg ou 10mg</u>
Page 38	<u>Dipiperon® comprimé 40mg (pipampérone)</u>
Page 39	<u>Dronabinol® (THC) solution huileuse 2,5% (1 goutte=0,7mg)</u>
Page 39	<u>Emadine® collyre 0,05mg/ml ophtalmiques (Emédastine)</u>
Page 40	<u>Enalapril Mepha® comprimé 5mg ou 10 mg ou 20 mg (Enalapril hydrogénomaléate)</u>
Page 41	<u>EpiPen® Junior / EpiPen® adulte (adrénaline)</u>
Page 42	<u>MODE D'EMPLOI EpiPen® (AU VERSO DE LA FEUILLE)</u>
Page 43	<u>Ethosuximide sirop, 250mg/5ml (médicament français)</u>
Page 43	<u>Euthyrox® comprimé 25µg ou 50 µg ou 75 µg ou 100 µg ou 125 µg ou 150 µg ou 175 µg ou 200 µg (lévothyroxine sodique)</u>
Page 44	<u>Feniallerg® gouttes 1mg/1ml (maléate de dimetindène)</u>
Page 45	<u>Fenistil® gel 0,1% (maléate de dimetindène)</u>
Page 46	<u>Flatulex® gouttes 41.2mg/ml</u>
Page 47	<u>Floxal® UD 0,3% collyre ophtalmiques (ofloxacine)</u>
Page 47	<u>Fluimucil® sirop 20mg/ml (acétylcystéine)</u>
Page 48	<u>Gatinar® sirop (lactulose)</u>
Page 49	<u>Hydrate de chloral → Nervifène®</u>
Page 49	<u>Lalugen® crème (Hyaluronate de sodium)</u>
Page 50	<u>Ibuprofene® Sandoz comprimé filmé 400mg ou 600 mg ou 800 mg (ibuprofène)</u>
Page 51	<u>Imurek® → voir Azathioprine®</u>
Page 51	<u>Inovelon® comprimé filmé 200mg ou 400mg (Rufinamide)</u>
Page 52	<u>Jemalt® Poudre en boîte de 900g ou 450g</u>
Page 53	<u>Keppra® comprimé filmé 250mg ou 500mg ou 1000mg (lévétiracétam)</u>

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Page 54	<u>Keppra® solution buvable 100mg/ml (lévétiracétam)</u>
Page 55	<u>Lamictal® comprimé disp. 5mg ou 25 mg ou 50mg ou 100mg ou 200mg (lamotrigine)</u>
Page 56	<u>Laxipeg® poudre (Macrogol) 40000 en sachet ou en flacon</u>
Page 57	<u>Laxoberon® solution buvable en gouttes de 15ml ou 30ml</u>
Page 58	<u>Lioréal® comprimé 10mg ou 25mg (Baclofène)</u>
Page 58	<u>Locoïd® crème 0,1% (Hydrocortisone-17-butyrate)</u>
Page 59	<u>Lyrica® capsule 25mg ou 50 mg 75mg ou 100mg ou 150 mg 200mg ou 300mg (Prégabaline)</u>
Page 60	<u>Macrogol-Mepha®</u>
Page 61	<u>Maltofer® gouttes 50mg/ml (Fer (III) ferrique)</u>
Page 62	<u>Medikinet® comprimé 5mg ou 10mg ou 20mg (méthylphénidate) STUPEFIANT</u>
Page 62	<u>Méfénacide® suppositoire 125mg ou 500mg (acide méfénamique)</u>
Page 63	<u>Ritaline® STUPEFIANT</u>
Page 64	<u>Microlax® Clyst rectal</u>
Page 65	<u>Midazolam intra-nasal</u>
Page 66	<u>Minirin Melt® sublingual 60mcg ou 120 sublingual (Desmopressine)</u>
Page 67	<u>Molaxole® poudre</u>
Page 68	<u>Movicol® junior sachet</u>
Page 69	<u>Multi-Sanasol</u>
Page 70	<u>Nasonex® spray nasal doseur 50mcg</u>
Page 71	<u>Nephrotrans® capsule 500mg</u>
Page 72	<u>Nervifene® sirop 100mg/1ml (Hydrate de chloral)</u>
Page 73	<u>Nexium® granulé 10mg (Esomeprazole)</u>
Page 74	<u>Nitrofurantoin® suspension 10mg/1ml</u>
Page 74	<u>Nozinan® gouttes 40mg/1ml (Lévomépromazine)</u>
Page 75	<u>Oméprazole® suspension CHUV orale 2mg/1ml ou 5mg/1ml</u>
Page 75	<u>Oméprazole® capsules 10mg ou 20mg ou 40mg</u>
Page 76	<u>Opatanol® collyre ophtalmique (olopatadine)</u>
Page 77	<u>Orfiril® long capsule retard 150mg ou 300mg Orfiril® long Minipacks granulé retard 500mg ou 1000mg ou Orfiril® sirop 60mg/1ml (acide valproïque)</u>
Page 78	<u>Ospolot® comprimé filmé 50mg ou 200mg (sultiame)</u>

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Page 79	<u>Oxyplastine® pâte cicatrisante</u>
Page 80	<u>Paragol® N sirop (paraffine liquide)</u>
Page 81	<u>Pevaryl® poudre 1% ou Pevaryl® crème 1% ou Pevaryl® spray 1%(Econazole nitrate)</u>
Page 82	<u>Ponstan® capsule 250mg ou Ponstan® comprimé filmé 500mg ou Ponstan® suppositoire 125mg ou 500mg ou Ponstan® suspension 10mg/1ml (acide méfénamique)</u>
Page 83	<u>Prednisone® Streuli comprimé 1mg 5mg ou 20mg ou 50mg (cortisone)</u>
Page 84	<u>Prograf® sirop (tacrolimus)</u>
Page 85	<u>Prorhinel® nasal</u>
Page 86	<u>Psychopax® gouttes 12,5mg/ml (Diazepam)</u>
Page 87	<u>Pulmex® onguent</u>
Page 88	<u>Quetiapin-Mepha® retard (quétiapine)</u>
Page 89	<u>Redormin® comprimé filmé (Valériane) 250mg ou 500mg</u>
Page 90	<u>Rhinathiol® sirop sans sucre (Carbocystéine) enfant 20mg/1ml</u>
Page 91	<u>Riopan® gel 80mg/1ml oral (Magaldrate)</u>
Page 92	<u>Risperdal® solution 1mg/1ml orale (rispéridone)</u>
Page 93	<u>Risperdal® comprimé Filmé 0,5mg ou 1mg ou 2mg ou 3mg ou 4mg (rispéridone)</u>
Page 94	<u>Ritaline® → méthylphénidate STUPEFIANT</u>
Page 94	<u>Rivotril® comprimés 0,5mg ou 2mg (clonazépam)</u>
Page 95	<u>Rivotril® gouttes 2,5 mg/ml (clonazépam)</u>
Page 96	<u>Sédatif PC Boiron® médicament Homéopatique</u>
Page 96	<u>Sequase® XR comprimé retard (Quetiapinum) 50mg 150mg 200mg 300mg 400mg</u>
Page 97	<u>Sérétide® 50/25 aérosol 50mcg/dose ou 125/25 aérosol 125mcg/dose ou 250/25 aérosol 250mcg/dose (Salmétérol)</u>
Page 97	<u>Seroquel® → voir Quetiapin</u>
Page 98	<u>Sirdalud® Comprimé 2mg ou 4mg</u>
Page 99	<u>SLENYTO® comprimés retard de 1mg ou 5mg (mélatonine à effet retard)</u>
Page 100	<u>Solian® comprimé 100mg ou 200mg (amisulpride)</u>
Page 101	<u>Solmucalm® sirop enfant (Acétylcystéine)</u>
Page 102	<u>Spironolactone (préparation magistrale) Caps 15mg (Aldactone®)</u>
Page 102	<u>Stesolid® comprimé 2mg ou 5 mg ou 10 mg (diazépam)</u>
Page 103	<u>Stesolid® rectal 5mg ou 10mg (diazépam)</u>

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Page 104	<u>Strattera® capsule 10mg ou 18mg ou 25mg ou 60mg ou 80mg ou 100mg (Atomoxétine) et sirop 4mg/ml</u>
Page 105	<u>Tégretol® Comprimé retard 200mg ou 400mg (Carbamazépine)</u>
Page 106	<u>Temesta® comprimé 1mg ou 2,5mg et Temesta Expidet comprimé orodisp. 1mg ou 2,5 mg (Lorazépam)</u>
Page 107	<u>Timonil® retard (carbamazépine)</u>
Page 108	<u>Topamax® comprimé filmé (topiramate) 25mg 50mg 100mg 200mg et capsule 15mg 50mg</u>
Page 109	<u>Torem® Comprimé 2,5mg ou 5mg ou 10mg</u>
Page 110	<u>Triofan® Rhume sans conservant, spray petit enfant/bébé (Xylométazoline HCl)</u>
Page 111	<u>Truxal® comprimé filmé 15 mg 50mg (Chlorprothixène)</u>
Page 112	<u>Urbanyl® comprimé 10mg (Clobazam)</u>
Page 113	<u>Ventolin® spray 100mcg/dose (salbutamol)</u>
Page 114	<u>Verrumal® solution (Fluorouracile)</u>
Page 115	<u>Vi-Dé 3® gouttes (cholécalférol)</u>
Page 116	<u>Vibrocil® gouttes nasales (phényléphrine)</u>
Page 117	<u>Viburcol® N suppositoire médicament homéopatique</u>
Page 118	<u>Vicks® Sinex spray (Oxymétazoline)</u>
Page 119	<u>Vimpat® comprimé filmé 50mg 100mg 150mg 200mg (Lacosamide)</u>
Page 120	<u>Vitamine® B6-Streuli comprimé 40mg 300mg (Pyridoxine)</u>
Page 121	<u>Xylo-Mepha® 0.05% (enfant) et 0.1% (adulte)</u>
Page 122	<u>Xyzal® gouttes comprimé filmé 5mg et gouttes 5mg/ml (Lévocétirizine)</u>
Page 123	<u>Zinat® suspension 25mg/ml (céfuroxime)</u>
Page 124	<u>Zithromax® comprimé filmé 250mg et suspension 40mg/ml et granulé 100mg 300mg 500mg (Azithromycine dihydrate)</u>
Page 125	<u>Zonegran® capsule 25mg 50mg 100mg (Zonisamide)</u>
Page 126-127	<u>Incident lors de l'administration d'un médicament anti-épileptique</u>

Médicaments en rouge : stupéfiant, suivre une procédure particulière, voir avec l'infirmier-ère de la structure

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Abilify® sirop 1mg/ml ou Abilify® 5mg comprimé (Aripiprazole)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Psycholeptique ⇒ Neuroleptique ⇒ Schizophrénie ⇒ Troubles bipolaires (épisodes maniaques)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Insomnie• Céphalées• Nausées	<ul style="list-style-type: none">• Pour comprimé : Peut être coupé Peut être écrasé Peut être dispersé ou dissous dans l'eau Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie Administration : Indépendamment des repas Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C)• Pour le sirop : Ne doit pas être dilué avec d'autres liquides ni mélangé à des aliments avant son administration. Peut être pris indépendamment des repas Une fois ouvert, se conserve 6 mois. Conserver à température ambiante (15 – 25 °C)

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Acétalgine® (paracétamol) => voir Dafalgan®



© HCI Solutions AG



© HCI Solutions AG



© HCI Solutions AG

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Aerius® 0.5mg/ml solution ou 5mg comprimé filmé (Desloratadine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
Antihistaminique (contre les allergies) : ⇒ Rhinite allergique ⇒ Urticaire	Fatigue	<ul style="list-style-type: none">• Boire un peu d'eau après la prise.• Attention chez les patients épileptiques, peut déclencher des crises convulsives.• Conserver à température ambiante (15 – 25 °C)• Administration : Indépendamment des repas Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C) Conservation après ouverture 6 mois à température ambiante (15°-25°)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Aldactone® comprimé filmé 25mg ou 50mg ou 100mg (spironolactone)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
Diurétique ⇒ Hypertension ⇒ Œdèmes	<ul style="list-style-type: none">• Gynécomastie, mastodynie• Céphalées,• Vertiges,• Nausées, vomissements,• Prurit, éruption cutanée• Crampes des membres inférieurs	<ul style="list-style-type: none">• Le comprimé peut être coupé, broyé et dilué dans de l'eau• L'enrobage du comprimé sert à masquer l'amertume de la spironolactone. Les restes relativement épais du film après broyage peuvent boucher les sondes de faible calibre, i.e duodénale et jéjunale.• Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique : Oui En site duodéнал : Oui En site jéjunal : Appeler la pharmacie• Conserver à température ambiante (15 – 25 °C)• Administration : avec le repas du matin ou midi <p>PRECAUTIONS DE MANIPULATION : port de gants</p>



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Algifor Dolo forte® 200mg/5ml ou Algifor Dolo Junior® 100mg/5ml ou Algifor Junior® 100mg/5ml (Ibuprofène)

Indication(s)	Délai d'action	Délai entre 2 prises	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Anti-inflammatoire ⇒ Analgésique ⇒ Antipyrétique 	Efficace dès 30-45 min.	Ne pas donner avant 6 à 8 heures d'intervalle	<ul style="list-style-type: none"> • Troubles gastro-intestinaux • Urticaire, éruptions cutanées 	<ul style="list-style-type: none"> • Secouer avant emploi • Administration : Indépendamment des repas • Conserver à température ambiante (15-25°C) • Si utiliser contre la douleur, évaluer la douleur avant et 30 minutes après. • Noter sur le flacon la date d'ouverture, utilisable 6 mois après l'ouverture. <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui</p> <p>En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui En site gastrique: Oui</p>

SANS ordonnance



AVEC ordonnance



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Amoxi-Mepha® 200m/4ml suspension ou Amoxi-Mepha® 50mg/1ml (amoxicilline)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Antibiotique⇒ traitement des infections bactériennes diverses	<ul style="list-style-type: none">• Diarrhées, nausées• Éruptions cutanées, rougeurs	<ul style="list-style-type: none">• Bien agiter avant emploi• Le sirop préparé se conserve au frigo pour 14 jours (noter la date d'ouverture)• Si la suspension n'est pas préparée (lire sur le carton) : secouer la poudre, mettre exactement 92ml d'eau du robinet, bien agiter, laisser reposer un peu• La poudre sèche peut se garder à température ambiante (15-25°C)• Administration : Indépendamment des repas



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Apydan Extent® 150mg ou 300mg ou 600 mg comprimé (Oxcarbazépine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Antiépileptique	<ul style="list-style-type: none">• Somnolence, fatigue,• Céphalées,• Vertiges,• Diplopie (vue double),• Nausées, vomissements	<ul style="list-style-type: none">• Doit être pris entier avec un peu d'eau, au moment des repas.• S'il y a des difficultés de déglutition, les comprimés peuvent être mis dans de l'eau sans avoir été broyés au préalable, et bus après avoir été agités (peut être dispersé ou dissous dans l'eau).• Conserver à température ambiante (15 – 25 °C)• Sécable en 4• Ne pas écraser• Administration : Au cours du/des repas



= 150mg



= 300mg



© HCl Solutions AG = 600mg

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Aripiprazole® → voir Abilify®

Atarax® sirop 2mg/1ml et Atarax® comprimé Filmé 25mg (Hydroxyzine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Hyper-excitabilité, tension, nervosité, insomnie et anxiété liée à une appréhension.</p> <p>⇒ Prurit.</p> <p>⇒ Prémédication avant une intervention chirurgicale.</p>	<p>Somnolence, sédation, fatigue</p> <p>Céphalées</p> <p>Sécheresse buccale</p>	<p>Pour le comprimé filmé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaler les comprimés filmés avec un peu de liquide • Les comprimés contiennent du lactose. • Prendre le sirop non dilué ou mélangé dans un jus de fruits. • Conserver à température ambiante (15–25 °C). • Sécable en 2 • Peut être écrasé • Peut être dispersé ou dissous dans l'eau • Le comprimé se dissout dans l'eau en 20 minutes environ <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui</p> <p>En site gastrique : Oui</p> <p>En site duodéal : Oui</p> <p>En site jéjunal : Appeler la pharmacie</p>
	<p>Spécificités</p> <p>Pour le sirop :</p> <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui</p> <p>En site gastrique : Oui</p> <p>En site duodéal: Oui</p> <p>En site jéjunal : Oui</p> <p>Conservation après ouverture : 6 mois</p> <p>Temp. amb. (15-25°C)</p>	



© HCl Solutions AG



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Axotide® aérosol 50 mcg ou 125 mcg ou 250 mcg (fluticasone) (mcg=microgramme)

Indications	Dosage	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Bronchique asthmatiforme	Nb de pushes	« Muguet » (infection bucco-pharyngée => taches blanches) Enrouement	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser la chambre d'inhalation (par exemple « AeroChamber ») • Pour éviter le muguet, faire de suite avant un repas ou rincer la bouche à l'eau • Réchauffer entre nos mains si froid (sortir de la protection plastique), car perte d'efficacité • Agiter avant emploi • Conserver en-dessous de 30°C et à l'abri du soleil direct



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed

120 doses
Compter les doses

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Azathioprin[®] (= Imurek) suspension 5mg/ml ou 25mg/ml /comprimé filmé 25mg ou 50 mg

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Contre les rejets de greffe</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infections virales, fongiques et bactériennes chez les patients greffés qui reçoivent de l'azathioprine en association avec d'autres immunosuppresseurs (62,3%). ▪ Troubles de la fonction médullaire (moelle osseuse), leucopénie (défiance en globules blancs) ▪ Nausées ▪ Alopécie (que pour greffe de rein) = perte des cheveux et poils 	<p>Pour comprimé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afin de réduire les effets secondaires gastro-intestinaux, prendre les comprimés pelliculés d'Imurek après les repas et avec du liquide. • Port de gants et masque lors de la manipulation • Veiller à ne pas inhaler ou mettre en contact avec la peau ou les muqueuses d'éventuelles particules de comprimés (p.ex. en cas d'endommagement d'un comprimé). En cas de contact cutané, laver la zone à l'eau et au savon et en cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau. • Conserver à température ambiante (15-25°C)/abri de lumière • Peut être coupé • Peut être écrasé <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui Mettre le comprimé dans une seringue Baxa et ajouter 10 mL d'eau; Le comprimé se délite en quelques minutes</p> <p>Pour suspension:</p> <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie Port de gants et masque de protection lors de la manipulation. Administration : Après le(s) repas Conservation après ouverture : Selon date d'expiration Temp. amb. (15-25)</p>

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Baclofen® sirop → voir Liorésal®

Ben-u-ron® sirop 200mg/5ml, comprimé 500mg ou 1000mg, suppo. 125mg ou 250mg ou 500mg (paracétamol)

Indications	Délai entre 2 prises	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Douleurs ⇒ Fièvre 	4-8h	Problèmes avec le foie en cas de surdosage, attention !	<ul style="list-style-type: none"> • Non ouvert, conserver à température ambiante (15-25°C) • Sirop : une fois ouvert, se conserve au frigo, pendant 6 mois. Noter la date d'ouverture dessus



= suppo.



= cp 500mg



= cp 1 g = 1000mg

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Betnesol® comprimé orodisp. 0,5mg (Bétaméthasone)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Allergies sévères⇒ Etat de mal asthmatique⇒ Affections rhumatologiques⇒ antiinflammatoire	<i>Les effets indésirables dépendent de la dose administrée et de la durée du traitement, de même que de l'âge, du sexe et de la maladie de fond du patient.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Hydrosoluble (soluble dans l'eau, dans une petite quantité d'eau)• Corticothérapie : normalement il s'agit d'une thérapie qu'il faut stopper progressivement en diminuant petit à petit les doses ; le traitement ne devrait pas être arrêté brusquement.• Ne pas conserver à plus de 30 °C et à l'abri de la lumière.• Sécable en 2 Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Bioflorin® 75 moi UI capsule (microorganismes produisant de l'acide lactique)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Normalisation de la flore intestinale,⇒ Anti-diarrhéique⇒ Antiinflammatoire et anti-infectieux intestinaux	Rien à ce jour	<ul style="list-style-type: none">• Si pris avec des antibiotiques, prendre à distance de la dose d'antibiotique d'1-2h (permet une meilleure efficacité de l'antibiotique)• Possible d'ouvrir la capsule et de verser la poudre dans des liquides froids ou tièdes• Se conserve à température ambiante (15-25°) Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie



© Documed



© Documed



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Broncho-Vaxom® sachets

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Prévention des infections récidivantes du système respiratoire⇒ Co-médication au traitement des infections aiguës du système respiratoire	<ul style="list-style-type: none">• Céphalées• Toux• Troubles gastro-intestinaux• Rash cutané	<p>A prendre à jeun (1 heure avant ou 2 heures après le(s) repas)</p> <ul style="list-style-type: none">• Le contenu du sachet doit être versé dans une boisson (eau, jus de fruit, lait, etc.)• Conserver à température ambiante (15-25°C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Bulboïd® 878 mg ou 1756 mg (glycérol)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Constipation⇒ Selles dures⇒ Laxatif	Rien	<ul style="list-style-type: none">• Conserver à température ambiante (15-25°C)



© Documed



© Documed



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Calcimagon-D3® (Calcium vit D3)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Traitement et prophylaxie des carences en vitamine D/calcium	Rares (troubles gastro-intestinaux, réactions cutanées)	<ul style="list-style-type: none">• <i>L'acide oxalique</i> (dans les épinards et la rhubarbe) et <i>l'acide phytique</i> (dans les céréales complètes) peuvent inhiber l'absorption du calcium. Recommandation d'attendre 2h après la prise d'aliments riches en acide oxalique et en acide phytique pour donner le calcium.• Peut être coupé• Peut être écrasé• Peut être dispersé ou dissous dans l'eau• Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C)



Existe plusieurs concentrations (exemple : 500/800_Forte, etc.) ou forme (comprimé, effervescent, etc.)

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Calmerphan-L® sirop (dextrométhorphan)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Toux, toux sèche d'irritation	Occasionnellement : <ul style="list-style-type: none">• Troubles gastro-intestinaux• Sédation• Vertiges	<ul style="list-style-type: none">• Agiter le flacon avant l'emploi.• Fréquence habituelle : matin et soir• Ne pas conserver un flacon entamé au-delà de 6 mois.• Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps, le sirop s'épaissit. Ce phénomène est tout à fait normal pour les préparations liquides dotées d'un effet prolongé. Il suffit d'agiter le flacon vigoureusement avant l'emploi et le sirop redevient suffisamment fluide pour permettre un dosage aisé et précis.• Conserver à température ambiante (15-25 °C) dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Carbolevure® capsule (Charbon médicinal en association)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Diarrhée aiguë⇒ Normalisation de la flore intestinale⇒ Troubles intestinaux après la prise d'antibiotiques⇒ Antidiarrhéiques, antiinflammatoires et anti-infectieux intestinaux	A fortes doses, peut provoquer une coloration foncée des selles et une constipation.	<ul style="list-style-type: none">• Donner à distance d'autres médicaments, car le charbon peut absorber certaines autres substances.• Avaler les gélules avec un peu de liquide, sans les croquer.• Chez les nourrissons: ouvrir la gélule, verser le contenu dans une cuillère et administrer.• Conserver à température ambiante (15–25 °C).



= adulte



= enfant

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Carnitene® sirop 300mg/ml (lévocarnitine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Déficits en carnitine : constituant naturel de l'organisme particulièrement abondant dans le tissu musculaire et le myocarde. Effet sur le maintien de la masse osseuse; action antioxydante.	Troubles gastro-intestinaux.	<ul style="list-style-type: none">• Conserver à température ambiante (15 à 25°C) et à l'abri de la lumière.• Le sirop est à utiliser dans un délai de 2 semaines après l'ouverture du flacon.



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Cetallerg® comprimé filmé 10 mg (cétirizine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Antihistaminique⇒ Rhinite ou conjonctivite allergique	<ul style="list-style-type: none">• Somnolence• Fatigue• Obnubilation• Troubles de la concentration• Vertiges• Céphalées	<ul style="list-style-type: none">• Prendre le médicament le soir, les symptômes étant plus marqués le soir.• Avaler les comprimés pelliculés sans les croquer, avec un liquide.• Conserver à température ambiante (15-25°C)• Sécable en 2• Peut être écrasé• Administration : Indépendamment des repas <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie Alternatives : Zyrtec - goutte - 10 mg/ml</p>



© Documed



© Documed

© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Cevanel® → voir Cerazette® comprimé filmé (désogestrel)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Pilule contraceptive⇒ (minipilule)	<ul style="list-style-type: none">• Hémorragies irrégulières• Prise de poids• Fluctuation de l'humeur• Céphalées• Nausées• Acné• Aménorrhée (pas de règles), douleurs mammaires)	<ul style="list-style-type: none">• Il faut prendre la pilule tous les jours pendant 28 jours, toujours à la même heure, dans l'ordre indiqué sur l'emballage, avec un peu de liquide. Quand une plaquette est vide, il faut en commencer une autre le lendemain, sans interruption de la prise.• <i>En cas de vomissements</i> : si pendant les 3–4 heures suivant la prise, le principe actif risque ne pas être totalement résorbé => suivre les instructions de « <i>En cas d'oubli de la prise d'un comprimé</i> ». Si les vomissements durent plus de 3–4 heures après la prise, il faut utiliser d'autres méthodes contraceptives.• <i>En cas d'oubli de la prise d'un comprimé</i> : si on réalise dans les 12 heures suivant l'heure normale, la prise doit avoir lieu immédiatement. Les pilules suivantes seront prises à l'heure habituelle. S'il s'est écoulé plus de 12 heures depuis l'heure normale de la prise, la fiabilité contraceptive est compromise. Il faut prendre immédiatement la pilule oubliée, même si cela implique la prise de deux pilules le même jour. Les pilules suivantes doivent être prises à l'heure habituelle. Pendant les 7 jours suivants, il faut utiliser, en plus, une méthode contraceptive mécanique.• Ne pas conserver au-dessus de 30 °C dans l'emballage original, à l'abri de la lumière et de l'humidité




Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Chlorprothixène → voir Truxal®

Ciproxin HC® suspension

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Inflammations bactériennes aiguës de l'oreille externe⇒ Hydrocortisone et antiinfectieux	Prurit (démangeaison) auriculaire	<ul style="list-style-type: none">• Bien agiter le flacon immédiatement avant l'emploi.• Se coucher, l'oreille atteinte dirigée vers le haut. Cette position devra être maintenue pendant 30 à 60 secondes, afin de faciliter la pénétration des gouttes dans le conduit auditif externe• Conserver à température ambiante (15–25 °C)• Conservation 14 jours à température ambiante une fois le compte goutte inséré



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Circadin® 2 mg → voir Mélatonine



Cisapride 1mg/ml suspension (= Prepulsid)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Utilisé pour soulager les symptômes de certains types de problèmes d'estomac, tels que les brûlures d'estomac.⇒ Il accélère la vidange de l'estomac et le mouvement de la nourriture dans l'estomac et l'intestin.	<ul style="list-style-type: none">• Troubles du rythme cardiaque• Céphalées, sensation de tête légère, étourdissement Somnolence• Douleurs à l'estomac• Selles liquides (diarrhée) ou constipation• Bouche sèche	<ul style="list-style-type: none">• Donner 15-30 minutes avant les repas et avant le coucher.• PAS DE PAMPLEMOUSSE → risque de graves troubles du rythme cardiaque !• Sirop à conserver au frigo ! <p>Médicament mis hors du commerce, effets secondaires graves, préférer un autre médicament.</p>

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Clarithrocin Mepha® suspension 25mg/ml ou 50mg/ml (clarithromycine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Pharyngites dues aux streptocoques ⇒ Otite moyenne aiguë ⇒ Impétigo (dermatose épidermique) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rhinite, infections • Insomnie • Céphalées • Conjonctivite • Toux 	<ul style="list-style-type: none"> • La suspension reconstituée peut être prise lors des repas. • Les suspensions Clarithrocin-Mepha peuvent laisser un arrière-goût amer dans la bouche. Pour éviter cela, il est recommandé de boire un peu de liquide immédiatement après la prise. • <u>Préparation de la suspension</u> : Bien agiter le granulé. Remplir le flacon d'eau du robinet jusqu'à la marque sur l'étiquette. Bien agiter, laisser reposer un instant et si nécessaire rajouter de l'eau jusqu'à la marque sur l'étiquette. • Une fois reconstituée, la suspension se conserve 14 jours à température ambiante (15–25 °C) et à l'abri de la lumière. • Conserver Clarithrocin-Mepha dans l'emballage original, à l'abri de la lumière et de l'humidité, à température ambiante (15–25 °C). • Administration : Indépendamment des repas
	<p style="text-align: center;">Spécificités</p> <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui</p>	



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Co-Amoxi® suspension 156.25 Mepha (31.25mg/ml) ou 312.5 Mepha (62.5mg/ml) ou 457 Mepha (91.4mg/ml) (amoxicilline + acide clavulanique)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Antibiotiques pour diverses infections bactériennes	<ul style="list-style-type: none"> Selles molles Diarrhées Douleurs abdominales Nausées Vomissements 	<ul style="list-style-type: none"> De préférence au début d'un repas Agiter avant chaque emploi Conservation du médicament non reconstitué (sans eau) à température ambiante (15-25°C) Conservation de la suspension prête : frigo, pendant 7 jours (noter la date d'ouverture) Pour reconstituer la suspension, suivre les indications sur le carton ou sur l'étiquette de la bouteille (mettre de l'eau du robinet, quantité indiquée sur le carton ou notice) <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui</p> <p>En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui</p>



© Documed



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

CollunosoL-N® (Chlorhexidine, lidocaïne)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Infections de la cavité bucco-pharyngienne aiguës⇒ (amygdalites⇒ Rhino-pharyngites⇒ Muguet⇒ Gingivites⇒ Pyorrhée, stomatites, aphtes⇒ Adjuvant en cas d'angines	<p>Lors de l'utilisation à long terme, on constate fréquemment des troubles gustatifs transitoires, une sensation de brûlure dans la cavité orale ainsi qu'une coloration jaunâtre à brune généralement réversible de la langue, des dents.</p> <p>Ne pas utiliser chez les enfants en bas âge, risque de dépression respiratoire</p>	<ul style="list-style-type: none">• En raison de l'effet anesthésiant du médicament, il est recommandé de ne pas l'utiliser immédiatement avant les repas.• Conserver à température ambiante (15–25 °C).• Noter la date d'ouverture• Un médicament par enfant



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Concerta® comprimé retard 18 mg ou 27mg ou 36mg ou 54mg (méthylphénidate) STUPEFIANT

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDA-H)	<ul style="list-style-type: none">• Rhinopharyngite• Insomnie• Vertiges, céphalées• Douleurs épigastriques, vomissements• Fièvre• Diminution de l'appétit• Hypertension• Arythmie, tachycardie, palpitations	<ul style="list-style-type: none">• Doit être pris entier avec du liquide. Il ne doit être ni croqué, ni écrasé, ni coupé en morceaux car le principe actif se trouve à l'intérieur d'une enveloppe non absorbable, au travers de laquelle il est libéré de façon contrôlée et continue.• Concerta peut être pris avec ou sans nourriture.• Stockage à température ambiante (15–25 °C).• Le récipient doit être bien fermé. Administration par sonde d'alimentation entérale : Non Ranger dans un tiroir fermé à clé différent des autres médicaments



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Dafalgan® comprimés 500mg (paracétamol)

Indication(s)	Délai d'action	Délai entre 2 prises	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Analgésique ⇒ Antipyrétique 	Efficace dès 45-60 min.	Pas avant 4 à 8 heures	Problèmes avec le foie en cas de surdosage, attention !	<ul style="list-style-type: none"> • Conserver à température ambiante (15-25°C) • Si utiliser contre la douleur, évaluer la douleur avant et 60 minutes après. • Peut être coupé • Peut être écrasé • Administration : Indépendamment des repas Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie Alternatives : Dafalgan - comprimé eff - 500 mg ou Dafalgan - sirop - 30 mg/ml



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Dafalgan® sirop 30mg/ml (paracétamol)

Indication(s)	Délai d'action	Délai entre 2 prises	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Analgésique Antipyrétique	Efficace dès 45-60 min.	4 à 8 heures	Problèmes avec le foie en cas de surdosage, attention !	<ul style="list-style-type: none"> Administration : Indépendamment des repas Conserver à température ambiante (15-25°C) Conservation après ouverture : 3 mois Temp. amb. (15-25°C) Noter la date d'ouverture Meurette va jusqu'à 16 kg Si utiliser contre la douleur, évaluer la douleur avant et 60 minutes après. Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Dafalgan® suppositoire 80mg, 150mg, 300mg, 600mg (paracétamol)

Indication(s)	Délai entre 2 prises	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Analgésique⇒ Antipyrétique	Pas avant 4 à 8 heures	Problèmes avec le foie en cas de surdosage, attention !	<ul style="list-style-type: none">• Conserver à température ambiante (15-25°C)• Si utiliser contre la douleur, évaluer la douleur avant et 60 minutes après.• Pas de suppositoire chez un enfant immuno supprimé, si lésion rectale, risque d'infection.



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Diazepam Mepha® rectal 5mg ou 10mg

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Traitement des convulsions fébriles et d'autres états convulsifs liés par exemple à une épilepsie.</p> <p>⇒ Voir document « En cas de crise convulsive-d'épilepsie »</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fatigue• Obnubilation• Faiblesse musculaire	<ul style="list-style-type: none">• La solution est administrée par voie rectale.• Les enfants doivent se coucher si possible sur le ventre ou le côté, les adultes sur le côté.<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrir l'emballage du tube rectal. Tourner le capuchon protecteur et le retirer.2. Introduire toute la longueur de l'embout du tube dans l'anus (chez le nouveau-né et le tout petit enfant, ne l'introduire qu'à moitié), en veillant à ce que la pointe soit dirigée vers le bas. Vider complètement le tube en le comprimant fortement avec le pouce et l'index.3. Retirer le tube rectal, tout en continuant à le comprimer, afin d'éviter le reflux de la solution dans le tube. Puis serrer les fesses du patient l'une contre l'autre pendant un certain temps.• Conserver à température ambiante (15-25°C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Dipiperon® comprimé 40mg (pipampérone)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Psychoses chroniques	<ul style="list-style-type: none">• Somnolence• Phénomène de la roue dentée	<ul style="list-style-type: none">• Indépendamment des repas• Avec un peu d'eau• Conserver à température ambiante (15-25°C)• Sécable en 4• Peut être écrasé• Peut être dispersé ou dissous dans l'eau Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéanal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie



© HCI Solutions AG



© HCI Solutions AG



© HCI Solutions AG → 40mg

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Dronabinol® (THC) solution huileuse 2,5% (1 goutte=0,7mg THC) STUPEFIANT

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Douleurs	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Dysphorie, ⇒ Confusion, ⇒ Vertige, ⇒ Somnolence, ⇒ Faiblesse musculaire, ⇒ Nausées, vomissements 	<ul style="list-style-type: none"> • Inodore et neutre au goût • Administration : prise avec un aliment gras tel yoghourt, lait ; ne pas mélanger avec de l'eau • Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) • Délai de péremption : le flacon ouvert se garde 3 mois • A ranger sous clé car c'est un stupéfiant

Emadine® collyre 0,05mg/ml ophtalmiques (Emédastine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Conjonctivite allergique	<ul style="list-style-type: none"> • Douleurs oculaires • Prurit oculaire 	<ul style="list-style-type: none"> • Afin d'éviter une contamination du compte-gouttes ou de la solution, ne jamais toucher les paupières, le contour des yeux ou d'autres surfaces avec le compte-gouttes. • Bien refermer le flacon après l'emploi ; valable 4 semaines après ouverture => noter la date. • Si <u>monodoses</u> : Jeter immédiatement après usage tout reste éventuel. Jetez les récipients unidoses non utilisés, une semaine après la première ouverture du sachet aluminium. • Conserver à température ambiante (15-25°C)



© Documed

FLACON



MONODOSE

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Enalapril Mepha® comprimé 5mg ou 10 mg ou 20 mg (Enalapril hydrogénomaléate)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Hypertension⇒ Insuffisance cardiaque symptomatique⇒ Dysfonction du ventricule gauche	<ul style="list-style-type: none">• Vertiges• Vision floue• Envie de vomir• Toux• Asthénie (fatigue)• Hypotension	<ul style="list-style-type: none">• Peut être pris avant, pendant et après le repas.• Conserver en-dessous de 25°C.• Sécable en 2• Peut être écrasé Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

EpiPen® Junior / EpiPen® adulte (adrénaline)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Traitement d'urgence lors de réactions allergiques de type immédiat à des piqûres d'insectes, à des aliments, à des médicaments...</p> <p>⇒ <u>Symptômes</u> : érythème généralisé, anxiété, perte de conscience, accélération de la fréquence cardiaque, pouls à peine perceptible associé à une chute de tension, convulsions, vomissements, diarrhée, crampes abdominales, incontinence, halètement, dyspnée laryngée, prurit, éruptions cutanées, urticaire ou angio-œdème</p>	<p>Rares en cas d'utilisation correcte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Après une injection avec Epipen/Epipen Junior, il convient de consulter immédiatement un médecin ou de se rendre dans un hôpital proche. • Après chaque utilisation d'Epipen/Epipen Junior, il faut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Appeler un médecin d'urgence en mentionnant le terme d'«anaphylaxie», même si les symptômes semblent déjà s'améliorer. 2. Les patients conscients doivent s'allonger, de préférence avec les pieds surélevés. En cas de troubles respiratoires, le patient doit s'asseoir. Les patients inconscients doivent être mis en position latérale de sécurité. • Doit être injecté exclusivement dans la face externe de la cuisse. Ne jamais s'injecter le produit dans la fesse ! • Si la solution injectable normalement incolore se colore (en rose ou brun) ou si un précipité se forme, il faut immédiatement remplacer l'auto-injecteur. • Si, <u>dans une situation d'urgence</u>, on ne dispose que d'un Epipen Junior coloré ou trouble, il vaut mieux administrer cette solution de qualité imparfaite que remettre l'injection à plus tard • Après utilisation, il doit être immédiatement éliminé et remplacé! • Conserver à température ambiante (15-25 °C). • Conserver dans l'étui de protection, à l'abri de la lumière, • Le mettre dans une boîte fermée avec le protocole d'urgence signé par un-e neurologue, inscrire dessus le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant. La boîte reste au plus près de l'enfant, sous la surveillance d'un adulte sachant utiliser l'Epipen. Demander une formation à l'infirmier-ère de la structure si besoin !

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

MODE D'EMPLOI EpiPen® (AU VERSO DE LA FEUILLE)



Mode d'emploi : Ne jamais poser le pouce, un autre doigt ou les mains sur l'extrémité orange. Ne retirer l'opercule de sécurité bleu que juste avant l'injection.

1. Saisir l'auto-injecteur dans le poing. Le pouce doit se trouver à côté de l'opercule de sécurité bleu. Ôter l'opercule de sécurité bleu de l'autre main.
2. Tenir l'auto-injecteur perpendiculairement à la face externe de la cuisse, l'extrémité orange tournée en direction de celle-ci.
3. Enfoncer l'auto-injecteur à angle droit dans la face externe de la cuisse avec une force suffisante pour déclencher le mécanisme d'injection (cela s'entend et se sent).
4. Après pénétration de l'aiguille, **maintenir l'auto-injecteur fermement pendant 10 secondes** dans cette position.

L'injection est alors terminée et la fenêtre de contrôle de l'auto-injecteur est devenue opaque. Retirer l'auto-injecteur (l'extrémité orange se déploie et vient alors recouvrir l'aiguille).

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES


L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Ethosuximide sirop, 250mg/5ml (médicament français)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Petites crises épileptiques (petit mal), en particulier absences.	Rares <ul style="list-style-type: none"> Nausées/vomissements Inappétence, douleurs gastriques, amaigrissement, diarrhée, fatigue, céphalées, vertiges, photophobie peuvent survenir surtout au début du traitement. 	<ul style="list-style-type: none"> Prendre pendant les repas Conserver à température ambiante (15-25 °C)

Euthyrox® comprimé 25µg ou 50 µg ou 75 µg ou 100 µg ou 125 µg ou 150 µg ou 175 µg ou 200 µg (lévothyroxine sodique)

Indications	Dosage	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ <u>Hypothyroïdie</u> : faible production d'hormones de la thyroïde. Ces hormones contribuent au bon fonctionnement des muscles, cœur et autres organes, et au maintien de la température corporelle.	En microgrammes (µg)	Troubles du rythme cardiaque, céphalées, insomnie, crises convulsives → effets présents si dose donnée trop importante, mal dosée ou surdosage	<ul style="list-style-type: none"> Matin, à jeun, 30 min. avant le repas Possible de laisser dissoudre dans l'eau Ne pas conserver au-dessus de 25°C Conserver à l'abri de la lumière Sécable en 2 Peut être écrasé Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Feniallerg® gouttes 1mg/1ml (maléate de dimétindène)

Indications	Dosage	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Urticaire⇒ Diverses allergies⇒ Piquûres d'insectes	En gouttes	<ul style="list-style-type: none">• Fatigue• Somnolence	<ul style="list-style-type: none">• Ne supportent pas des températures trop élevées. Si besoin de mettre dans un biberon, il doit être tiède et mettre au dernier moment.• Donner pur, à la cuillère.• Conserver à l'abri de la lumière, température ambiante (15-25°C)• Conservation 6 mois à température ambiante après ouverture• 20 gouttes par ml• Pas avant 1 mois Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunale: Oui



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Fenistil® gel 0,1% (maléate de dimétindène)

Indications	Dosage	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
Démangeaisons, piqûres d'insectes, brûlures légères	<i>Moins de 2 ans</i> : que sur ordonnance médicale Appliquer 2-4x/jour Efficacité maximale après 1-4h	Sécheresse de la peau	<ul style="list-style-type: none">• Conserver à température ambiante (15-25°C)



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Flatulex® gouttes 41.2mg/ml

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Toutes les formes d'accumulation ou de formation de bulles gazeuses en excès au niveau gastro-intestinal (flatulence, aérophagie)	---	<ul style="list-style-type: none">• 2 jets = 1ml• Administration : après les repas• Bien agiter le flacon de gouttes avant l'emploi.• Les gouttes peuvent être mélangées à un peu de liquide. Elles peuvent être ajoutées sans autre au contenu du biberon ou au lait.• Se conserve à température ambiante (15-25°C)• Conservation après ouverture : 6 mois Temp. amb. (15-25°C)• Noter la date d'ouverture sur le flacon Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéнал: Oui En site jéjunal: Oui



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Floxal® UD 0,3% collyre ophtalmiques (ofloxacine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Infections bactériennes de l'œil	<ul style="list-style-type: none"> • Picotements transitoires • Hypersensibilité 	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser un nouveau flacon à chaque application et le jeter immédiatement après usage. • Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Fluimucil® sirop 20mg/ml (acétylcystéine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Toux avec formation excessive de mucus	Divers, dont la fréquence est inconnue (au besoin, se référer au Compendium)	<ul style="list-style-type: none"> • Une fois ouvert, le sirop prêt à l'emploi se conserve pendant 15 jours, à température ambiante (15–25 °C). • Noter la date d'ouverture sur le flacon Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie




Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Gatinar® sirop (lactulose)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Constipation	<ul style="list-style-type: none">• Flatulence• Douleurs abdominales	<ul style="list-style-type: none">• Se prend pendant ou après les repas• Se conserve à température ambiante (15-25°C)• Conservation après ouverture : 6 mois Temp. amb. (15-25°C)• Noter la date d'ouverture sur le flacon



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Hydrate de chloral → Nervifène®

Lalugen® crème (Hyaluronate de sodium)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Lésion cutanée⇒ Cicatrisation	Sur un très long terme => hypersensibilité	<ul style="list-style-type: none">• Appliquer une fine couche de lalugen uniformément sur la totalité de la lésion, 2 à 3 fois par jour, jusqu'à cicatrisation complète; la crème peut être éliminée par simple lavage à l'eau.• Conserver à température ambiante (15–25 °C).



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Ibuprofene® Sandoz comprimé filmé 400mg ou 600 mg ou 800 mg (ibuprofène)

Indication(s)	Délai d'action	Délai entre 2 prises	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Anti-inflammatoire ⇒ Analgésique ⇒ Antipyrétique	Efficace dès 30-45 min.	Pas avant 6 à 8 heures	<ul style="list-style-type: none">• Troubles gastro-intestinaux• Eruptions cutanées• Limitation de la capacité de réaction (principalement en association avec l'alcool)• Céphalées, vertiges	<ul style="list-style-type: none">• Après les repas.• Prendre avec un verre d'eau.• Le comprimé se dissout en 5 minutes environ• Conserver à température ambiante (15-25°C)• Si utiliser contre la douleur, évaluer la douleur avant et 30 minutes après.• Sécable en 2• Peut être écrasé• Peut être dispersé ou dissous dans l'eau Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie



= 400 mg

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Imurek® → voir Azathioprine®

Inovelon® comprimé filmé 200mg ou 400mg (Rufinamide)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Epilepsie	<ul style="list-style-type: none">• Somnolence, céphalées, vertiges• Nausées, vomissements• Fatigue	<ul style="list-style-type: none">• Il est préférable de prendre au cours des repas• Il est possible d'écraser les comprimés pelliculés et de les prendre dans un demi-verre d'eau.• Sécable en 2• Conserver à température ambiante (15-25°C)



© Documed



© Documed

© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Jemalt® Poudre en boîte de 900g ou 450g

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Complément alimentaire riche en vitamines, sels minéraux		<ul style="list-style-type: none">• La poudre se mélange facilement au lait, muesli, yoghourt, séré• Contient du lactose et gluten• Conserver à T° ambiante (15-25°C), protéger de l'humidité• Stockage : bien refermer la boîte ; date de péremption identique dès l'ouverture



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Keppra® comprimé filmé 250mg ou 500mg ou 1000mg (lévétiracétam)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Epilepsie	<ul style="list-style-type: none">• Somnolence• Fatigue• Etourdissement• Nervosité, agitation	<ul style="list-style-type: none">• Peut être dilué dans un verre d'eau mais le comprimé se délite difficilement.• Peut être coupé• Peut être écrasé• Administration : Indépendamment des repas• Conserver à température ambiante (15-25°C)/Abri de la lumière Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Keppra® solution buvable 100mg/ml (lévétiracétam)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Epilepsie	<ul style="list-style-type: none">• Somnolence• Fatigue• Etourdissement• Nervosité, agitation	<ul style="list-style-type: none">• Administration : Indépendamment des repas• Conserver à température ambiante (15-25°C)• Noter sur le flacon la date d'ouverture,• Conservation après ouverture : 6 mois Temp. amb. (15-25°C) Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Lamictal® comprimé disp. 5mg ou 25 mg ou 50mg ou 100mg ou 200mg (lamotrigine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Antiépileptique	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiges, Céphalées, Somnolence, Fatigue • Diplopie, vue trouble • Nausées, vomissements, diarrhées • Éruption cutanée 	<ul style="list-style-type: none"> • Indépendamment des repas • Le comprimé peut être soit croqué, soit mis en suspension dans un peu d'eau (l'eau doit au moins recouvrir le comprimé), soit être avalé entier avec un peu de liquide. • Conserver à température ambiante (15-25°C), au sec, à l'abri de la lumière Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Laxipeg® poudre (Macrogol) 40000 en sachet ou en flacon

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Laxatif => constipation	<ul style="list-style-type: none">• Diarrhée• Douleurs abdominales	<ul style="list-style-type: none">• La dose journalière peut être administrée à jeun en une seule prise ou répartie en deux prises.• La quantité totale doit être bue assez rapidement (en quelques minutes) et non pas en petites gorgées prolongées.• Un régime riche en liquide favorise l'effet du médicament• Le contenu de la mesurette (2,5 g) est dilué dans au moins un demi-verre d'eau (environ 60 ml).• Ne pas y ajouter d'autres ingrédients.• Diluer le contenu d'un sachet (10g) dans au moins 125 ml (1 verre) d'eau.• Conserver le récipient dans le carton afin de protéger le contenu de la lumière et de l'humidité. Conserver à température ambiante (15-25°C).• Une fois ouvert, le contenu du flacon se conserve pendant 90 jours.



© HCI Solutions AG



© HCI Solutions AG

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Laxoberon® solution buvable en gouttes de 15ml ou 30ml (1ml=15gouttes)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
Laxatif ⇒ Constipation	⇒ Crampes abdominales ⇒ Diarrhées ⇒ Risque de déshydratation	<ul style="list-style-type: none">Administration : avec ou sans apport de liquide, de préférence le soir au coucherAdministration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique : Oui En site duodéнал : Oui En site jéjunal : OuiLa durée du traitement ne doit pas excéder 1-2 semainesConserver à température ambiante (15 – 25°C)Stabilité : 6 mois après ouverture



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Lioréal® comprimé 10mg ou 25mg (Baclofène)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Myorelaxant (relâche les muscles) ⇒ Spasticité sévère 	<ul style="list-style-type: none"> • Torpeur et somnolence • Nausées 	<ul style="list-style-type: none"> • Doit être pris pendant les repas • Séable en 2 • Peut être écrasé <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie Conditions de stockage : Temp. amb. / Abri de lumière</p>



© HCl Solutions AG



© HCl Solutions AG



© HCl Solutions AG

Locoïd® crème 0,1% (Hydrocortisone-17-butyrate)


Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Affections cutanées d'origine eczémateuse, inflammatoire ou allergique 	<p>Très rares</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les corticoïdes sont incompatibles avec l'oxyde de zinc. • Mettre des gants pour appliquer la crème • Conserver à température ambiante (15-25°C)

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Lyrica® capsule 25mg ou 50 mg 75mg ou 100mg ou 150 mg 200mg ou 300mg (Prégabaline)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Douleurs neuropathiques ⇒ Troubles anxieux généralisés ⇒ Adjuvant lors de crises partielles d'épilepsie 	<ul style="list-style-type: none"> • Étourdissement • Somnolence • Augmentation de l'appétit 	<ul style="list-style-type: none"> • Peut se prendre indépendamment des repas • Si stop : diminution sur 1 semaine minimum. • Conserver à température ambiante (15-25°C) • Peut être ouverte <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p>



© HCl Solutions AG = 25mg




© HCl Solutions AG = 100mg



© HCl Solutions AG = 300mg



© HCl Solutions AG = 50mg



© HCl Solutions AG = 150mg



© HCl Solutions AG = 75mg



© HCl Solutions AG = 200mg

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Macrogol-Mepha®

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Laxatif => constipation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Troubles gastro-intestinaux (douleurs abdominales) • Nausées • Vomissement 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Macrogol-Mepha</u> : après 12 ans • <u>Macrogol-Mepha Junior</u> : avant 12 ans • Diluer le contenu d'un sachet dans environ 70 ml d'eau et boire. • L'arôme de la solution peut être amélioré avec un peu de jus d'orange ou de sirop. • <i>Poudre</i> : Conserver dans le récipient d'origine, à une température ne dépassant pas 25 °C et à l'abri de l'humidité. • <i>Solution buvable</i> : La solution buvable préparée se conserve au réfrigérateur (2–8 °C) dans un récipient propre fermé ou muni d'un couvercle pendant 24 heures. <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui</p> <p>En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui</p>



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Maltofer® gouttes 50mg/ml (Fer (III) ferrique)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Carence en fer	<ul style="list-style-type: none"> • Coloration des selles • Diarrhées • Nausées 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant ou immédiatement après les repas • Possible de mélanger à du jus de fruits ou légumes, ou mettre dans le biberon • Ne pas secouer le flacon • Conserver à température ambiante (15-25°C) • Conservation après ouverture : 6 mois Temp. amb. (15-25°C) • Noter la date d'ouverture sur le flacon • 20 gouttes par ml <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p> <p>Remarques : Le fer étant principalement absorbé dans le duodénum et le jéjunum supérieur, risque de diminution de la biodisponibilité lors d'une administration par sonde jéjunale.</p>



© Documed



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Medikinet® comprimé 5mg ou 10mg ou 20mg (méthylphénidate) STUPEFIANT

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) des enfants à partir de 6 ans et des adolescents jusqu'à 18 ans⇒ Psycho-analéptique	<ul style="list-style-type: none">• Rhinopharyngite• Diminution de l'appétit• Insomnie, nervosité• Nausées• Sécheresse de la bouche	<ul style="list-style-type: none">• Les comprimés peuvent être pris avec ou sans repas• Conserver les comprimés dans l'emballage d'origine, pour protéger le contenu de l'humidité.• Ne pas conserver au-dessus de 25 °C.• Ranger dans un tiroir fermé à clé différent des autres médicaments

Méfénacide® suppositoire 125mg ou 500mg (acide méfénamique)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Analgésique⇒ Antipyrétique	<ul style="list-style-type: none">• Irritations locales en usage prolongé• Maux d'estomac, nausée, vomissement	<ul style="list-style-type: none">• Conserver à température ambiante (15–25 °C).



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Ritaline® STUPEFIANT

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDA-H)</p> <p>⇒ Psycho-analéptique</p>	<ul style="list-style-type: none">• Rhinopharyngite• Insomnie, nervosité• Diminution de l'appétit• Nausées, sécheresse buccale• Fièvre• Diminution de l'appétit• Hypertension• Arythmie, tachycardie, palpitations	<p>Plutôt après les repas.</p> <p>Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C) Conservation après ouverture : Selon date d'expiration Temp. amb. (15-25°C)</p> <p>Ranger dans un tiroir fermé à clé différent des autres médicaments</p> <p>Il existe une forme retard !</p>

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Microlax® Clyst rectal

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Constipation⇒ Laxatif	<ul style="list-style-type: none">• Douleurs abdominales• Gêne anorectale• Diarrhée	<ul style="list-style-type: none">• Ce médicament est à utilisation rectale.• Il convient d'administrer une dose 5-20 minutes avant la survenue de l'effet souhaité.• Une goutte du contenu du tube, étalée sur la canule, suffit comme lubrifiant.• Conserver à température ambiante (15–25 °C).




Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Midazolam intra-nasal

Indication(s)	Dosage	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Crise d'épilepsie Voir document « En cas de crise Convulsive-d'Epilepsie »	Selon le protocole d'épilepsie de l'enfant signé par son neurologue	<ul style="list-style-type: none">• Sédation• Somnolence• Dépression respiratoire• Nausées / vomissements	<ul style="list-style-type: none">• Administration de la moitié de la dose dans chaque narine• Enlever le bouchon de la seringue et bien viser l'embout conique en mousse• Besoin d'un certain temps pour avoir une dose auprès de la pharmacie (entre 1 et 7 jours)• Commande des seringues uniquement à la Pharmacie 24 (Lausanne)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Minirin Melt® sublingual 60mcg ou 120 sublingual (Desmopressine)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Diabète insipide d'origine centrale (déficit en hormone anti-diurétique)⇒ Polyurie (urines abondantes)⇒ Polydipsie (suite à une ablation de l'hypophyse ou une intervention chirurgicale sur l'hypophyse)⇒ Énurésie nocturne dès 5 ans (mictions involontaires et inconscientes)	<ul style="list-style-type: none">• Céphalées• Troubles gastro-intestinaux• Baisse transitoire de la tension artérielle, élévation de la fréquence du pouls• Asthénie	<ul style="list-style-type: none">• A conserver à température ambiante (15–25 °C) dans l'emballage original à l'abri de la lumière et de l'humidité• Peut être coupé• Mcg= µg=microgramme



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Molaxole® poudre

Indication(s)	Dosage	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Constipation ⇒ Laxatif 	Par nb de sachets	<ul style="list-style-type: none"> • Douleurs abdominales • Nausées, vomissements • Diarrhées 	<ul style="list-style-type: none"> • Après 12 ans • Le contenu d'un sachet doit être pris après dilution dans 125 ml d'eau. • <u>Poudre</u>: conserver dans le récipient d'origine, à température ambiante (15 à 25 °C) et à l'abri de l'humidité. • <u>Solution buvable</u>: la solution buvable préparée peut être conservée jusqu'à 6 heures au réfrigérateur (2 à 8 °C) dans un récipient propre fermé ou couvert. • Observation des selles selon l'échelle de Bristol <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui</p> <p>En site gastrique: Oui</p> <p>En site duodéal: Oui</p> <p>En site jéjunal: Oui</p>



© Documed



© Documed




© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Movicol® junior sachet

Indication(s)	Dosage	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Constipation	Par nb de sachets	<ul style="list-style-type: none"> • Douleurs abdominales • Nausées, vomissements • Diarrhées 	<ul style="list-style-type: none"> • Diluer dans environ 70ml d'eau (1/4 de verre) • La solution peut être gardée 24h au frigo (2-8°C) • Le sachet se conserve à température ambiante (15-25°C), à l'abri de l'humidité • Observation des selles selon l'échelle de Bristol <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui</p> <p>En site gastrique: Oui</p> <p>En site duodéal: Oui</p> <p>En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p>



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Multi-Sanasol

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Préparation polyvitaminée avec minéraux, malt et concentré d'oranges⇒ Fatigue⇒ Prévention et traitement en cas de carence ou de besoins accrus en vitamines	<p>Si la posologie recommandée est respectée, aucun effet secondaire n'est à redouter, même en cas de prise prolongée. La vitamine B2 (riboflavine) peut entraîner une coloration jaune de l'urine, qui ne présente aucun danger.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Agiter avant l'emploi!• A prendre de préférence ¼ h à ½ h avant un repas.• Conserver au frais (8-15 °C) et à l'abri de la lumière.



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Nasonex® spray nasal doseur 50mcg

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Rhinite allergique saisonnière et chronique	<ul style="list-style-type: none">• Epistaxis• Pharyngite• Brûlure nasale, irritations nasales, ulcérations nasales• Céphalées	<ul style="list-style-type: none">• Utilisé que par voie intranasale. Il est important d'utiliser régulièrement pour atteindre un effet thérapeutique complet.• Avant la première utilisation, le spray doseur devrait être purgé => actionner la pompe environ 10 fois jusqu'à ce qu'une nébulisation homogène soit visible.• Lorsque Nasonex n'a pas été utilisé pendant plus de 14 jours, appuyer 2 fois sur le dispositif de pompage avant l'emploi.• Bien secouer Nasonex avant chaque usage.• Utiliser dans les 2 mois suivant la première utilisation.• Conserver à température ambiante (15–25 °C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Nephrotrans® capsule 500mg

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Traitement de l'acidose métabolique	⇒ Douleurs gastro-intestinales, ⇒ Ballonnements, ⇒ Diarrhées	<ul style="list-style-type: none">• Capsules molles gastro-résistantes : à ne pas croquer, ni ouvrir• Pas d'administration par sonde d'alimentation entérale• Conserver à température ambiante (15 – 25 °C)• Administration : avec les repas



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Nervifene® sirop 100mg/1ml (Hydrate de chloral)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Hypnotique ⇒ Sédatif ⇒ Troubles du sommeil et de l'endormissement (assure un sommeil pendant 5-8 heures) ⇒ État d'excitation nerveuse 	<ul style="list-style-type: none"> • Somnolence, mal de tête, vertiges, anxiété, cauchemars, troubles du sommeil. • Troubles oculaires: myosis (pupille toute petite), ptosis (chute de la paupière), conjonctivite allergique. • Dépression respiratoire en cas de surdosage 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre bien diluer dans l'eau froide. L'arrière-goût âcre sera éliminé en buvant de l'eau sitôt après son ingestion. • Un phénomène de tolérance peut intervenir déjà après 2 semaines d'utilisation continue. • L'utilisation chronique peut entraîner une dépendance. • En cas d'usage prolongé, on veillera à éviter un arrêt brutal de la médication pour éviter les conséquences d'un sevrage brutal. • A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur dans l'emballage d'origine fermé. <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui Conditions de stockage : Temp. amb. / Abri de lumière Conservation après ouverture : 6 mois Temp. amb. (15-25°C) / Abri de lumière</p>



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Nexium® granulé 10mg (Esomeprazole)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Traitement de l'œsophagite de reflux ⇒ Prévention des ulcères gastriques 	<ul style="list-style-type: none"> • Maux de tête • Troubles gastro-intestinaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Le contenu d'un sachet de 10 mg est versé dans un verre contenant 15 ml (1 cuillère à soupe) d'eau non gazeuse. Remuer, puis attendre quelques minutes jusqu'à ce que le liquide ait épaissi. Remuer à nouveau et boire le mélange en l'espace de 30 minutes. Si des résidus se trouvent encore dans le verre, ajouter encore un peu d'eau, remuer et boire immédiatement. • Pour administrer une dose de 10 mg chez les patients porteurs d'une sonde gastrique, prendre une seringue contenant 15 ml d'eau et y ajouter le contenu d'un sachet de 10 mg. Après ajout des granulés, secouer immédiatement la seringue et attendre ensuite quelques minutes jusqu'à ce que le liquide ait épaissi. Secouer encore une fois la seringue, puis administrer la préparation à travers la sonde en l'espace de 30 min. Remplir à nouveau la seringue de 15 ml d'eau, secouer et administrer par la sonde afin de rincer les restes de médicament. Alternative : préparation CHUV • Administration indépendamment des repas • Conserver à température ambiante (15-25 °C).



© HCI Solutions



© HCI Solutions

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Nitrofurantoin® suspension 10mg/1ml

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Antibiotique efficace contre la plupart des agents pathogènes responsables des infections urinaires	Troubles gastro-intestinaux	<ul style="list-style-type: none"> Pour une meilleure tolérance, la nitrofurantoïne doit être prise avec suffisamment de liquide pendant ou immédiatement après les repas. Les réactions gastro-intestinales peuvent être réduites en prenant le médicament avec de la nourriture ou du lait Possible coloration brunâtre des urines Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C) Conservation après ouverture : Selon date d'expiration au frigo (2-8°C)

Nozinan® gouttes 40mg/1ml (Lévomépromazine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Etats d'excitation psychomoteurs ⇒ Schizophrénie ⇒ Psychoses chroniques avec hallucinations ⇒ Etats d'excitation maniaque ⇒ Agressivité de la déficience mentale	<ul style="list-style-type: none"> Somnolence et sédation Hypotension orthostatique (tension chute en se levant) 	1 ml (= 40 gouttes) Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site duodéal: Oui En site gastrique: Oui En site jéjunal: Oui Conditions de stockage : Temp. amb. / Abri de lumière Conservation après ouverture : 6 mois Temp. amb. (15-25°C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Oméprazole® suspension CHUV orale 2mg/1ml ou 5mg/1ml

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ulcères ⇒ Reflux gastro-œsophagien ⇒ Œsophagite de reflux 	<ul style="list-style-type: none"> • Céphalées • Troubles gastro-intestinaux 	Agiter avant emploi Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui Conditions de stockage : Frigo (2 - 8°C) Conservation après ouverture : Selon date d'expiration au frigo (2-8°C)

Oméprazole® capsules 10mg ou 20mg ou 40mg

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ulcères ⇒ Reflux gastro-œsophagien ⇒ Œsophagite de reflux 	<ul style="list-style-type: none"> • Céphalées • Troubles gastro-intestinaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre avec un demi verre d'eau, sans mâcher, de préférence le matin. • Les capsules peuvent être ouvertes et leur contenu directement avalé avec de l'eau ou mélangé dans des boissons légèrement acides (par ex. jus, yoghourt) avant d'être avalé. Préparé ainsi, le médicament doit être pris immédiatement (dans les 30 minutes). • Ne pas utiliser du lait ou de l'eau gazéifiée. • Les capsules ne doivent être ni mâchées, ni broyées. • Peut être ouverte Administration par sonde d'alimentation entérale : Non Prendre l'Oméprazole en suspension



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Opatanol® collyre ophtalmique (olopatadine)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Conjonctivite allergique saisonnière chez les adultes et chez les enfants à partir de 3 ans.	<ul style="list-style-type: none">• Gêne oculaire	<ul style="list-style-type: none">• Pour éviter toute contamination du bout du compte-gouttes et de la solution du flacon, les paupières et les parties adjacentes à l'œil ne doivent pas rentrer en contact avec le bout du compte-gouttes du flacon.• Bien refermer le flacon après son utilisation.• En cas de traitement simultané avec gouttes/pommades ophtalmologiques, il faut respecter un délai de 5 à 10 minutes entre les administrations successives.• L'Opatanol peut être utilisé jusqu'à 4 semaines après la première ouverture du flacon.• Conserver à température ambiante (15-25 °C).• 30 gouttes par 1ml



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Orfiril® long capsule retard 150mg ou 300mg Orfiril® long Minipacks granulé retard 500mg ou 1000mg ou Orfiril® sirop 60mg/1ml (acide valproïque)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Epilepsie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tremblements • Nausées • Prise de poids • Confusion, somnolence, agressivité, agitation <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>© HCl Solutions AG = 150 mg capsule retard</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>© HCl Solutions AG = 300mg capsule retard</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>© HCl Solutions AG</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant ou après les repas • Gélules peuvent être ouvertes (mettre dans boisson gazeuse ou aliment mou), ne pas croquer • Minipacks : aussi dans boisson ou aliment mou, ne pas croquer • Conserver à l'abri de l'humidité, à température ambiante (15-25°C) • Noter sur le flacon la date de son ouverture • Sirop et gélules : une fois le pot/flacon ouvert, se conserve 12 semaines <p><u>Pour le sirop :</u> Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui</p> <p><u>Pour les capsules et Minipacks:</u> Peut être ouverte Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui Remarques : Ne pas écraser les microgranules (perte de l'effet retard) Microgranules : risque de boucher la sonde !</p>

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Ospolot® comprimé filmé 50mg ou 200mg (sultiamé)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Epilepsie	<ul style="list-style-type: none">• Vertiges, céphalées• Diplopie• Irritabilité, fatigue• Douleurs gastriques• Problèmes respiratoires	<ul style="list-style-type: none">- Les comprimés pelliculés se prennent sans les croquer avec une grande quantité d'eau (environ 1 verre d'eau)- Conserver dans l'emballage original à température ambiante (15 - 25 °C)



© Documed



© Documed



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Oxyplastine® pâte cicatrisante

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Protection de la peau⇒ Dermate fessière⇒ Légères lésions cutanées		<ul style="list-style-type: none">• Appliquer suivant les besoins une à plusieurs fois par jour sur la partie à traiter• Conserver à température ambiante (15 - 25 °C)• Noter la date d'ouverture sur le tube• Conserver le tube 6 mois après son ouverture



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Paragol® N sirop (paraffine liquide)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laxatif lubrifiant ➤ Traitement de brève durée de la constipation. ➤ Lésions anales, hémorroïdes douloureuses et affections qui nécessitent une facilitation de la défécation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suintement anal 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant le coucher. • Bien agiter avant l'usage. Doit seulement être pris en position verticale. • Peut être pris non dilué, mais également dans de l'eau, des jus de fruits ou d'autres boissons. • En règle générale, l'effet se manifeste 6 à 8 heures plus tard, donc le lendemain matin seulement. • Du fait de l'accélération du transit intestinal, il peut se produire une perte de l'efficacité des médicaments administrés par voie orale. • Conserver à température ambiante (15-25 °C).



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Pevaryl® poudre 1% ou Pevaryl® crème 1% ou Pevaryl® spray 1%(Econazole nitrate)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Antifongique (champignons)⇒ Mycoses cutanées	<ul style="list-style-type: none">• Prurit• Brûlures cutanées• Douleurs	<ul style="list-style-type: none">• Ne convient pas à l'application au niveau de l'œil ou par voie orale.• Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Ponstan® capsule 250mg ou Ponstan® comprimé filmé 500mg ou Ponstan® suppositoire 125mg ou 500mg ou Ponstan® suspension 10mg/1ml (acide méfénamique)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Antipyrétique ⇒ Analgésique ⇒ Anti-inflammatoire 	<ul style="list-style-type: none"> • Maux d'estomac, vomissement, nausée 	<ul style="list-style-type: none"> • À prendre pendant les repas • Conserver à température ambiante (15–25 °C) <p><u>Pour la capsule :</u> Peut être ouverte Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p> <p><u>Pour le comprimé filmé :</u> Peut être coupé Peut être écrasé Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p> <p><u>En suspension :</u> Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui Conservation après ouverture : 6 mois Temp. amb. (15-25°C)</p>



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Prednisone® Streuli comprimé 1mg 5mg ou 20mg ou 50mg (cortisone)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Anti-inflammatoire/immunosuppresseur⇒ Allergies⇒ Rhumatismes⇒ Maladies de la peau⇒ Troubles endocriniens⇒ Maladies des yeux⇒ Maladies hépatiques (du foie) et gastro-intestinales	<ul style="list-style-type: none">• Troubles sur une grande partie des systèmes du corps humain (sanguin, immunitaire, gastro-intestinal, cardio-vasculaire, musculo-squelettique, cutané...)	<ul style="list-style-type: none">• Conserver à température ambiante (15-25°C)• Sécable en 2• Peut être écrasé• Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui <p>En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p>



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Prograf® sirop (tacrolimus)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Prévention des rejets de greffes hépatique (foie), rénale et cardiaque⇒ Traitement des réactions de rejets après transplantation hépatique (foie)	<ul style="list-style-type: none">• Risque accru d'infections opportunistes (bactériennes, fongiques, virales et protozoaires)• États hyperglycémiques• Insomnie• Tremblements• Maux de tête• Hypertension• Diarrhée, nausées• Diminution de la fonction rénale	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas prendre avec du jus de grapefruit.• Exposition aux rayons UV: en raison du risque potentiel de modifications malignes de la peau, les patients qui sont longtemps exposés au soleil ou aux UV doivent se protéger avec des produits anti-solaires d'indice élevé.• Ne donner aucun autre médicament, même homéopathique => grands risques d'interactions• Les préparations phytothérapeutiques à base de millepertuis, ou d'autres préparations de phytothérapie, doivent être évitées en raison du risque de diminution de son efficacité.• Le tacrolimus n'est pas compatible avec le PVC, il est absorbé par le PVC.• Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Prorhinel® nasal

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Traitement local des inflammations des muqueuses nasales⇒ Humidifier la muqueuse nasale sèche⇒ Nettoyer les fosses nasales⇒ Traiter la rhinite croûteuse	<ul style="list-style-type: none">• Manifestations allergiques locales ou cutanées	<ul style="list-style-type: none">• Pas avant 2 ans• Les mono-doses utilisées sont destinées à un emploi immédiat et ne peuvent être réutilisées.• Conserver à température ambiante (15-25°C).



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Psychopax® gouttes 12,5mg/ml (Diazepam)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Anxiété, tension, agitation psychique, excitation émotionnelle.⇒ Maladies psychosomatiques.⇒ Troubles du sommeil.⇒ Adjuvant dans le traitement des spasmes musculaires, des états spastiques de la musculature squelettique.	<ul style="list-style-type: none">• Fatigue, somnolence, tremblements, vertige, céphalées• Vision floue• Modification de la fréquence du pouls, hypotension et bradycardie.• Dépression respiratoire.• Troubles gastro-intestinaux• Faiblesse musculaire.• Rétention urinaire et incontinence urinaire.	<ul style="list-style-type: none">• Les gouttes peuvent être prises sur un morceau de sucre ou diluées dans de l'eau, du thé ou une autre boisson• Conserver à température ambiante (15–25 °C).• Conservation après ouverture : 6 mois Temp. amb. (15-25°C)• Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui <p>En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui</p>

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Pulmex® onguent

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Pour le traitement symptomatique des maladies des voies respiratoires supérieures, comme les refroidissements, le rhume et la toux.	Réaction cutanée	<ul style="list-style-type: none">• Conserver à 15–30 °C.• Frictionner doucement sur la poitrine et le dos 2 à 3 fois par jour, la dernière application ayant lieu de préférence avant d'aller au lit.• Appliquer un peu de pommade Pulmex, le long de la ligne médiane de la partie supérieure du dos et de la poitrine. Faire pénétrer en massant légèrement, puis couvrir avec un tissu en laine ou coton chaud et sec.• Bien laver les mains après l'application.• Utilisation de Pulmex à partir de 3 ans• En cas de crises de convulsions dans l'anamnèse, Pulmex (comme toutes les préparations contenant des dérivés de terpènes) ne doit pas être utilisé.



© HCI Solutions AG

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Quetiapin-Mepha® retard (quétiapine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Schizophrénie⇒ Épisodes manique ou dépressif des troubles bipolaires	<ul style="list-style-type: none">• Prise de poids• Rêves inhabituels, cauchemars• Somnolence, vertige• Palpitations• Vision trouble• Sécheresse buccale• Constipation• Céphalées	<ul style="list-style-type: none">• Peut être pris indépendamment des repas.• Le patient ne doit pas consommer de jus de pamplemousse pendant le traitement• Ne pas couper• Ne pas écraser• Administration par sonde d'alimentation entérale : Non• Administration : En dehors du/des repas• Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Redormin® comprimé filmé (Valériane) 250mg ou 500mg

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Difficultés d'endormissement ⇒ Troubles du sommeil ⇒ Sommeil agité	Troubles gastro-intestinaux	<ul style="list-style-type: none">• Avec un peu de liquide, une heure avant le coucher• Conserver à température ambiante (15-25°C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Rhinathiol® sirop sans sucre (Carbocystéine) enfant 20mg/1ml

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ En cas d'affection des voies respiratoires entraînant la formation de sécrétions épaisses difficiles à expectorer, telles que les toux dues à un refroidissement, bronchites aiguës.</p> <p>⇒ Traitement adjuvant d'otites moyennes accompagnées de sécrétions visqueuses chez l'enfant.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Gastralgies• Brûlures d'estomac• Nausées• Diarrhées	<ul style="list-style-type: none">• Le sirop Rhinathiol doit être utilisé dans un délai de 2 semaines après ouverture.• Conserver à température ambiante (15-25 °C).• Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 1 an



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Riopan® gel 80mg/1ml oral (Magaldrate)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Hyperacidité gastrique	<ul style="list-style-type: none">Ramollissement des selles	<ul style="list-style-type: none">Une fois entamé, le flacon de Riopan Gel doit être utilisé dans les 6 moisConserver à température ambiante (15 à 25 °C)Administration : A jeun (1 heure avant ou 2 heures après le(s) repas)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Risperdal® solution 1mg/1ml orale (rispéridone)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Troubles de la sociabilité, du comportement lié à des réactions d'opposition ou d'autres comportements socialement dérangeants chez l'enfant ;</p> <p>⇒ Troubles autistiques accompagnés de symptômes du type hyperactivité et irritabilité (y compris agressivité, automutilation, anxiété et comportements répétitifs) chez les enfants dès 5 ans</p>	<ul style="list-style-type: none">• Parkinsonisme• Somnolence• Céphalées• Insomnies	<ul style="list-style-type: none">• Incompatible avec le thé noir• Conserver à température ambiante (15–25 °C)• Garder maximum 3 mois après ouverture (noter la date sur le flacon)• Administration : Indépendamment des repas <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui</p> <p>En site gastrique: Oui</p> <p>En site duodéнал: Oui</p> <p>En site jéjunal: Oui</p>



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Risperdal® comprimé Filmé 0,5mg ou 1mg ou 2mg ou 3mg ou 4mg (rispéridone)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Troubles de la sociabilité</p> <p>⇒ Troubles autistiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parkinsonisme • Somnolence • Céphalées • Insomnies 	<ul style="list-style-type: none"> • Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, à température ambiante (15–25 °C) • Administration : Indépendamment des repas • Séable en 2 • Peut être écrasé • Peut être dispersé ou dissous dans l'eau <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui</p> <p>En site gastrique: Oui</p> <p>En site duodéal: Oui</p> <p>En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p> <p>Alternatives :</p> <p>Rispéridone Sandoz - solution - 1 mg/mL ou</p> <p>Rispéridone Sandoz - comprimé orodisp - 0.5 mg</p>



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Ritaline® → méthylphénidate STUPEFIANT

Rivotril® comprimés 0,5mg ou 2mg (clonazépam)

Indication(s)	Délai d'action	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Epilepsie	Efficace dès 30-60 min.	<ul style="list-style-type: none">• Excitabilité• Troubles du sommeil• Fatigue• Somnolence	<ul style="list-style-type: none">• Séable en 2 ou 4• Peut être écrasé• Peut être dispersé ou dissous dans l'eau• Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui• En site gastrique: Oui• En site duodéal: Oui• En site jéjunal: Oui• Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Rivotril® gouttes 2,5 mg/ml (clonazépam)

Indication(s)	Délai d'action	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Epilepsie	Efficace dès 30-60 min.	<ul style="list-style-type: none">• Excitabilité• Troubles du sommeil• Fatigue• Somnolence	<ul style="list-style-type: none">• Avec eau, thé ou jus de fruit• Noter la date d'ouverture du flacon• 25 gouttes par ml• Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui• En site gastrique: Oui• En site duodéal: Oui• En site jéjunal: Oui• Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C)• Conservation après ouverture : 4 mois Temp. amb. (15-25°C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Sédatif PC Boiron® médicament Homéopatique

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Anxiété ⇒ Tension nerveuse 	----	<ul style="list-style-type: none"> • Les comprimés de saveur légèrement sucrée peuvent être sucés ou écrasés dans un peu d'eau. • Conserver à température ambiante (15-25°C)



Sequase® XR comprimé retard (Quetiapinum) 50mg 150mg 200mg 300mg 400mg

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Schizophrénie ⇒ Troubles bipolaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de poids, appétit accru • Somnolence • Sécheresse buccale • Céphalées 	<ul style="list-style-type: none"> • Doit être administré hors des repas une fois par jour. • Les comprimés retard doivent être avalés entiers. Ils ne doivent jamais être divisés, croqués ou broyés. • Ne pas consommer de jus de pamplemousse. • Ne pas conserver à une température au-dessus de 30 °C.



=50mg



=150mg



=200mg



=300mg



=400mg

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Sérétide® 50/25 aérosol 50mcg/dose ou 125/25 aérosol 125mcg/dose ou 250/25 aérosol 250mcg/dose (Salmétérol)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">Corticostéroïde inhalé => asthme (pour un traitement chronique)	<ul style="list-style-type: none">Infection de la muqueuse bucco-pharyngéeCéphaléesEnrouement, dysphonieCrampes musculaires, arthralgies	<ul style="list-style-type: none">Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C)Protégé du gel et de l'exposition directe aux rayons UV.



Seroquel® → voir Quetiapin

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Sirdalud® Comprimé 2mg ou 4mg

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
Myorelaxant ⇒ Tensions musculaires douloureuses	<ul style="list-style-type: none">• Somnolence, fatigue,• Vertiges,• Sécheresse buccale,• Hypotension	<ul style="list-style-type: none">• Le comprimé est sécable en 2, il peut être broyé, dissous dans de l'eau• Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique : Oui En site duodéнал : Oui En site jéjunal : Appeler la pharmacie• Prise avec ou en-dehors des repas• Arrêt de traitement en schéma dégressif• Conserver à T° ambiante (15-25°C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

SLENYTO® comprimés retard de 1mg ou 5mg (mélatonine à effet retard)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Troubles du sommeil	<ul style="list-style-type: none">• Somnolence, fatigue matinale• Céphalées• Irritabilité• Sinusite	<ul style="list-style-type: none">• Comprimés à libération prolongée : ils ne doivent être ni cassés, ni écrasés, ni mâchés, ni dissous• Pas d'administration par sonde d'alimentation entérale• Contient du lactose et glucose• Administration : 30min à 1h avant le coucher



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Solian® comprimé 100mg ou 200mg (amisulpride)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Schizophrénie	Symptômes extrapyramidaux (tremblements, hypertonie, rigidité, hypokinésie (Diminution progressive ou soudaine de l'activité motrice d'un membre ou d'un organe), hypersalivation, akathisie (impossibilité de s'asseoir ou de rester dans la position assise), dyskinésie (mouvement anormal)	<ul style="list-style-type: none">• Sécable en 2 selon compendium• Peut être écrasé• Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C) Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Solmucalm® sirop enfant (Acétylcystéine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Toux grasse	L'effet sédatif se manifeste fréquemment (sommolence, diminution de la capacité de réaction)	<ul style="list-style-type: none">• Préparation du sirop: voir la notice d'emballage.• Une fois reconstitué, le sirop se conserve pendant 2 semaines à température ambiante.• Conserver à température ambiante (15–25 °C)• Le principe actif chlorphénamine contenu dans la solution renfermée dans le flacon de Solmucalm peut lors d'ingestion accidentelle provoquer des effets indésirables graves, voire empoisonnements chez le petit enfant.



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Spironolactone (préparation magistrale) Caps 15mg (Aldactone®)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>Diurétique</p> <p>⇒ Hypertension</p> <p>⇒ Œdèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gynécomastie, mastodynie • Céphalées, • Vertiges, • Nausées, vomissements, • Prurit, éruption cutanée • Crampes des membres inférieurs 	<ul style="list-style-type: none"> • La capsule peut être ouverte et le contenu dilué dans de l'eau • Administration par sonde d'alimentation entérale : OUI En site gastrique : Oui En site duodéal : Oui En site jéjunal : Appeler la pharmacie • Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) • Administration : avec le repas du matin ou midi • Précautions de manipulation : port de gants

Stesolid® comprimé 2mg ou 5 mg ou 10 mg (diazépam)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Agitation</p> <p>⇒ Tension nerveuse</p> <p>⇒ Anxiété</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fatigue • Obnubilation • Faiblesse musculaire 	<ul style="list-style-type: none"> • Peut être coupé • Peut être écrasé • Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C) Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique : Oui En site duodéal : Oui En site jéjunal : Appeler la pharmacie



© Documed



© Documed



© Documed



© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Stesolid® rectal 5mg ou 10mg (diazépam)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<p>⇒ Crise d'épilepsie ⇒ Convulsions fébriles</p> <p>Voir document « En cas de crise Convulsive-d'Epilepsie »</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fatigue• Obnubilation• Faiblesse musculaire	<ul style="list-style-type: none">• Conserver à température ambiante (15-25°C) et à l'abri de la lumière• Dosage selon le protocole d'épilepsie de l'enfant signé par son neurologue<ul style="list-style-type: none">✓ Mettre des gants✓ Enlever le bouchon✓ Mettre de l'eau ou un lubrifiant sur l'embout du Stesolid✓ Mettre l'enfant sur le côté✓ Disposer un linge pour préserver la pudeur✓ Écarter les fesses et insérer l'embout à 1/3✓ Injecter tout le produit✓ Maintenir le sachet du microclyste comprimé entre vos doigts tout en le retirant ainsi le médicament ne remontera pas dans le sachet✓ Resserrer les fesses et enlever l'embout



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Strattera® capsule 10mg ou 18mg ou 25mg ou 60mg ou 80mg ou 100mg (Atomoxétine) et sirop 4mg/ml

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Trouble du Déficit de l'Attention/Hyperactivité (TDAH)	<i>Chez l'enfant :</i> <ul style="list-style-type: none">• Maux de tête• Douleurs abdominales• Baisse de l'appétit• Somnolence• Augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle	<ul style="list-style-type: none">• Peut être administré pendant ou en dehors des repas• Il n'est pas recommandé de mélanger Strattera sirop avec des aliments ou de l'eau car cela pourrait empêcher le patient de recevoir une dose complète ou altérer de manière désagréable le goût.• <u>Solution buvable</u> : durée de conservation après la première ouverture 45 jours.• Conserver à température ambiante (15-25 °C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Tégrétol® Comprimé retard 200mg ou 400mg (Carbamazépine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Epilepsie	<ul style="list-style-type: none">• Rétention liquidienne, prise de poids• Vertiges, ataxie (manque de coordination fine des mouvements volontaires), somnolence / épuisement• Nausées, vomissements, sécheresse de la bouche• Prurit, urticaire	<ul style="list-style-type: none">• Comprimé à libération prolongée• Avaler les CR Divitabs tels quels (entiers ou selon prescription par moitié) avec un peu d'eau, sans les mâcher.• Conserver à l'abri de l'humidité et à température ambiante (15-25 °C).• Sécable en 2• Ne pas écraser• Ne pas disperser ou dissoudre dans l'eau• Administration par sonde d'alimentation entérale : Non• Perte de l'effet retard si le comprimé est dispersé dans de l'eau avant administration

P.S. Existe aussi sous la forme non retard et en liquide



© Documed



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Temesta® comprimé 1mg ou 2,5mg et Temesta Expidet comprimé orodisp. 1mg ou 2,5 mg (Lorazépam)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Excitation⇒ Anxiété⇒ Tensions et troubles du sommeil	<ul style="list-style-type: none">• Sédation• Epuisement• Somnolence	<ul style="list-style-type: none">• Sécable en 2• Peut être écrasé• Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C)

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Timonil® retard (carbamazépine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Epilepsie	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiges, céphalées, somnolence / épuisement • Ataxie (manque de coordination fine des mouvements volontaires) • Vision trouble • Nausées, vomissements • Sécheresse de la bouche • Prurit, urticaire 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprimé à libération prolongée • Sécable en 2 • Ne pas écraser • Peut être pris avec un peu d'eau, pendant ou après les repas, ou après désagrégation (mise en suspension) dans l'eau. • Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C) • Peut être dispersé ou dissous dans l'eau <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p> <p>Remarques : L'effet retard se maintient aussi après la mise en suspension des comprimés retard</p> <p>Remarques : Risque de boucher la sonde</p> <p>Alternatives : Timonil - sirop - 20 mg/mL</p>



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Topamax® comprimé filmé (topiramate) 25mg 50mg 100mg 200mg et capsule 15mg 50mg

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Épilepsie ⇒ Migraine 	<ul style="list-style-type: none"> • Diminution de l'appétit • Somnolence • Fatigue • Léthargie • Agressivité 	<ul style="list-style-type: none"> • Les capsules peuvent être ouvertes, saupoudrées sur des aliments mous, à prendre de suite • Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C) • Administration : Indépendamment des repas <p><u>Pour les comprimés filmés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut être coupé • Peut être écrasé <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p> <p><u>Pour les capsules</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut être ouverte <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p> <p>Remarques : Risque de coller sur les parois de la sonde</p>



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Torem® Comprimé 2,5mg ou 5mg ou 10mg

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
Diurétique ⇒ Hypertension	<ul style="list-style-type: none">• Fatigue, faiblesse,• Céphalées,• Vertiges,• Crampes musculaires,• Nausées, vomissements, diarrhées, constipation	<ul style="list-style-type: none">• Sécable en 2 (sauf les comprimés de 2,5mg)• Les comprimés peuvent être écrasés et dissous dans l'eau• Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique : Oui En site duodéнал : Oui En site jéjunal : Appeler la pharmacie• Conserver à température ambiante (15 – 25 °C)• Administration : le matin, avec ou en-dehors des repas



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Triofan® Rhume sans conservant, spray petit enfant/bébé (Xylométazoline HCl)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Rhume⇒ Rhinite⇒ Sinusite	Irritation transitoire	<ul style="list-style-type: none">• Introduire l'orifice du spray dans la narine et exercer une seule pression énergique, puis retirer l'appareil avant de relâcher la pression.• Pour favoriser une bonne répartition du nébulisat, inspirer légèrement par le nez pendant l'application.• Conserver à température ambiante (15–25 °C)• Bien préciser la durée d'administration



Nourrissons et enfants jusqu'à 6 ans



Dès 6 ans, adulte

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Truxal® comprimé filmé 15 mg 50mg (Chlorprothixène)

⇒ Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Schizophrénie et autres psychoses avec troubles psychomoteurs, anxiété et agitation.⇒ Comme mesure de soutien en cas d'agitation, de nervosité et d'angoisse en relation avec des syndromes dépressifs, névroses.	<ul style="list-style-type: none">• Augmentation de l'appétit, prise de poids• Insomnie, nervosité, agitation• Somnolence, vertiges• Sécheresse buccale, salivation excessive	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas conserver au-dessus de 25 °C• Peut être coupé• Peut être écrasé Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Urbanyl® comprimé 10mg (Clobazam)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Anxiété⇒ Épilepsie	<ul style="list-style-type: none">• Agitation, excitation• Troubles du sommeil• Faiblesse musculaire• Dépression respiratoire	<ul style="list-style-type: none">• Sans croquer avec un verre d'eau• Peut être écrasé et mélangé à une compote de pommes• Conserver à température ambiante (15-25°C)• Sécable en 2• Peut être écrasé <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Appeler la pharmacie</p>




Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Ventolin® spray 100mcg/dose (salbutamol)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Antiasthmatique	<ul style="list-style-type: none">• Tremblements des mains• Céphalées• Palpitations, augmentation de la fréquence cardiaque	<ul style="list-style-type: none">• Conserver en-dessous de 30°C, pas d'exposition directe au soleil• Réchauffer dans les mains si froid (moins efficace)• La cartouche est vide lorsqu'elle pèse moins de 15gr sans le plastique



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Verrumal® solution (Fluorouracile)

Indication(s)	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Verrues	<ul style="list-style-type: none">• Céphalées• Desquamation cutanée• Erythème• Inflammation• Irritation (y compris sensation de brûlure)• Douleurs• Prurit	<ul style="list-style-type: none">• Destiné à être utilisé sur la peau.• Verrumal ne doit être appliqué que sur la verrue et non sur la peau saine entourant la verrue; le cas échéant, protéger la peau environnante avec de la vaseline.• Fermer soigneusement le flacon après chaque emploi, sinon la solution se dessèche rapidement• La solution ne doit pas être utilisée en cas de cristallisation.• Lors de l'application de Verrumal, il faut veiller à ce que la solution n'entre en contact ni avec des textiles ni avec de l'acrylique (p.ex. baignoires en acrylique), car elle produit des taches indélébiles.• Inflammable!• Stabilité après ouverture: 6 mois.• Conserver à température ambiante (15-25 °C)



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Vi-Dé 3® gouttes (cholécalférol)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Carence en vitamine D, besoin accru en vitamine D, rachitisme	Symptômes d'une intoxication, peu caractéristiques, sont les suivants: faiblesse, fatigue, somnolence, céphalées, anorexie, bouche sèche, goût métallique dans la bouche, nausée, vomissements, crampes abdominales, constipation, diarrhée, vertiges, acouphènes, ataxie, exanthème, hypotension chez les enfants, douleurs musculaires et osseuses ainsi qu'irritabilité	<ul style="list-style-type: none">• Peut être pris pur ou dilué dans un verre d'eau• Le flacon doit être conservé dans son emballage extérieur à l'abri de la lumière.• Conditions de stockage : Température ambiante (15-25°C)• Conservation après ouverture : 6 mois Temp. amb. (15-25°C)• 1 goutte de Vi-De 3 contient 65% vol. d'alcool• 45 gouttes par ml Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui




© Documed

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Vibrocil® gouttes nasales (phényléphrine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Refroidissement⇒ Sinusite⇒ Rhinite allergique⇒ Rhume des foies	Rares	<ul style="list-style-type: none">• Avant l'utilisation, nettoyer soigneusement le nez (par ex. en se mouchant).• Incliner légèrement la tête en arrière. Instiller les gouttes dans chaque narine et laisser la tête inclinée en arrière un petit moment pour que les gouttes puissent se répartir.• Nettoyer et sécher la pipette avant de la revisser sur le flacon.• Conserver à température ambiante (15–25 °C) et à l'abri de la lumière• Bien préciser la durée max d'administration



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Viburcol® N suppositoire médicament homéopatique

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Etats d'agitation avec pleurs⇒ Insomnie⇒ Douleurs dues à la pousse des dents ou de coliques	-----	<ul style="list-style-type: none">• Conserver à température ambiante (15-25 °C).



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Vicks® Sinex spray (Oxymétazoline)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
<ul style="list-style-type: none">⇒ Rhume⇒ Sinusite	Rares	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas utiliser chez les nourrissons et les enfants de moins de 6 ans.• Après la première ouverture ne pas utiliser plus de 12 mois.• Conserver à température ambiante (15 et 25 °C)• Bien préciser la durée maximum d'administration



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Vimpat® comprimé filmé 50mg 100mg 150mg 200mg (Lacosamide)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Antiépileptique	<ul style="list-style-type: none">• Sensations vertigineuses, céphalées• Nausées• Diplopie	<ul style="list-style-type: none">• Peut être pris indépendamment des repas• Conserver à température ambiante (15–25 °C)• Peut être coupé• Peut être écrasé Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéna: Oui En site jéjuna: Oui



P.S : Existe aussi sous la forme sirop

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Vitamine® B6-Streuli comprimé 40mg 300mg (Pyridoxine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Déficit en vitamine B6	<ul style="list-style-type: none">Parfois acné ou eczéma acnéiforme	<ul style="list-style-type: none">Avaler les comprimés sans les mâcher avec un peu de liquide. Ils peuvent également être écrasés et ajoutés à la nourriture.Conserver à température ambiante (15–25 °C)Sécable en 2Peut être écrasé Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéнал: Oui En site jéjunal: Non Remarques : La vitamine B6 est absorbée au niveau du segment supérieur de l'intestin grêle.



© HCI Solutions AG



© HCI Solutions AG



© HCI Solutions AG

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Xylo-Mepha® 0.05% (enfant) et 0.1% (adulte)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Rhume	<ul style="list-style-type: none">• Maux de tête• Sécheresse nasale, troubles nasaux, sensation de brûlure• Nausées• Brûlure au site d'administration	<ul style="list-style-type: none">• Conserver à température ambiante (15–25 °C).• Après ouverture du spray doseur, doit être utilisé dans les 12 mois qui suivent.• Bien préciser la durée max d'administration



= Enfant



= Adulte

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Xyzal® gouttes comprimé filmé 5mg et gouttes 5mg/ml (Lévocétirizine)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Antihistaminique	<ul style="list-style-type: none">• Somnolence• Sécheresse buccale• Céphalées• Fatigue	<ul style="list-style-type: none">• Indépendamment des repas• Conserver à température ambiante (15-25 °C).• <u>Le comprimé</u> devrait être pris sans croquer avec du liquide.• Sécable en 2• Peut être écrasé• <u>Les gouttes</u> peuvent être prises non diluées ou diluées dans de l'eau.• 20 gouttes par ml• Après ouverture du flacon des gouttes, conservation à température ambiante 6 mois. Noter la date sur le flacon <p><u>Pour les gouttes :</u> Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: Oui</p>



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Zinat® suspension 25mg/ml (céfuroxime)


Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Antibiotique pour les infections bactériennes	<ul style="list-style-type: none">• Céphalées, vertiges• Troubles gastro-intestinaux	<ul style="list-style-type: none">• Prendre pendant les repas• Au besoin, la suspension peut être mélangée à une boisson froide pour enfants comme du jus de fruit ou du lait immédiatement avant la prise• La poudre sèche se conserve à moins de 30 °C dans l'emballage original• La suspension reconstituée doit être immédiatement déposée au réfrigérateur (2-8 °C) et être conservée à l'abri de la lumière dans son emballage original.• Le sirop préparé se conserve 10 jours au frigo (noter la date d'ouverture)• Bien agiter le flacon avant chaque emploi• Pour reconstituer la suspension, procéder de la manière suivante: Agiter le flacon avec les granulés. Remplir le gobelet gradué inclus dans l'emballage avec de l'eau du robinet exactement jusqu'à la marque (27 mL pour 70 mL de suspension). Verser en une seule fois l'eau dans le flacon, bien refermer, le renverser et l'agiter vigoureusement pendant 15 secondes au moins. Remettre ensuite le flacon à l'endroit et l'agiter encore une fois vigoureusement. Déposer immédiatement la suspension reconstituée au réfrigérateur (2-8 °C). <p>Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodénal: Oui En site jéjunal: Oui Administration : Au cours du/des repas</p>

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Zithromax® comprimé filmé 250mg et suspension 40mg/ml et granulé 100mg 300mg 500mg (Azithromycine dihydrate)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Infections des voies respiratoires et autres infections	<ul style="list-style-type: none">• Anorexie• Troubles gastro-intestinaux	<ul style="list-style-type: none">• Les comprimés pelliculés, la suspension et les sachets peuvent être pris avec ou sans nourriture. La prise antérieure de nourriture peut améliorer la tolérance gastro-intestinale.• Conserver à température ambiante (15–25 °C) Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéal: Oui En site jéjunal: appeler la pharmacie



Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Zonegran® capsule 25mg 50mg 100mg (Zonisamide)

Indications	Effets secondaires les plus fréquents	Spécificités
⇒ Antiépileptique	<ul style="list-style-type: none">AnorexieAgitation/irritabilité, états confusionnels, dépressionVertiges, troubles de la mémoire, somnolence, céphalées, diplopieTroubles respiratoires	<ul style="list-style-type: none">Peut être pris indépendamment des repas.Conserver à température ambiante (15–25 °C) Administration par sonde d'alimentation entérale : Oui En site gastrique: Oui En site duodéanal: Oui En site jéjunal: appeler la pharmacie



© HCl Solutions AG



© HCl Solutions AG



© HCl Solutions AG



© HCl Solutions AG



© HCl Solutions AG



© HCl Solutions AG

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Incident lors de l'administration d'un médicament anti-épileptique

Que faire si...

1) J'ai oublié d'administrer un médicament anti-épileptique

- Je n'administre pas le médicament lorsque je réalise cet oubli **ET**
- J'administre le traitement à l'heure suivante inscrite dans la planification.

2) J'ai administré une dose trop élevée.

- J'évalue la quantité administrée **ET**
- J'avise le médecin référent de l'enfant pour convenir de la suite.

Selon les consignes du Dr S. Lebon, neuropédiatre CHUV et du Dr M. Zedka, médecin référent ESS 2020.

DANS TOUT LES CAS : Je suis la démarche à entreprendre lors d'un incident

- 1) Si l'enfant présente une urgence vitale : appeler le 144 24 h/24 et commencer les gestes de premiers secours.
- 2) Si l'enfant n'est pas en urgence vitale, mais qu'il présente une altération de sa santé, un mal-être, que son état est préoccupant ou pour obtenir un conseil, contacter rapidement la Centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG) au 0848 133 133.
- 3) Si l'enfant ne présente pas d'altération de sa santé, mais qu'un incident médicamenteux est survenu (erreur de médicament, double prise, oubli d'une prise, etc.), un médecin doit être informé de l'incident dans tous les cas afin d'évaluer les risques.

Répertoire des médicaments à l'usage des structures relevant de l'OSPES

L'usage de ce document n'engage en rien la responsabilité des auteurs, ainsi que le CHUV.

Contacteur soit :

- Le médecin de la structure
- Le médecin traitant de l'enfant avec l'accord du / de responsable légal.e
- Le médecin référent ESS au 079 556 85 22 (le vendredi)
- La Centrale téléphonique des médecins de garde (CTMG) au 0848 133 133

Dans tous les cas, l.e.a responsable légal.e doit être informé.e afin de convenir ensemble de la suite de la prise en charge de l'enfant.

L.e.a responsable de la structure est informé.e rapidement.

Remplir le document « Déclaration d'incident anonyme » accessible sur Google : équipe soins et soutien CHUV

L'envoyer à l'Equipe soins et soutien (ESS) à l'adresse soins.soutien@chuv.ch