

En cas de crise Convulsive-d'Épilepsie

Si l'enfant n'est pas connu pour une épilepsie et qu'il convulse téléphonez au 144 et suivez les consignes suivantes!

1. Je reste calme.
2. Je regarde l'heure pour mesurer le temps de la crise.
3. J'appelle un-e collègue pour m'aider.
4. Je sécurise l'enfant pour éviter les blessures (*enlever les objets blessants, mettre un habit/coussin sous sa tête, etc.*).
5. Je sécurise les lieux (*faire sortir les autres personnes de la pièce, voie publique*).
6. Je desserre ses vêtements.
7. J'installe l'enfant en Position Latérale de Sécurité (PLS) si possible pour assurer la liberté des voies respiratoires.
8. Je rassure l'enfant.
9. Je respecte le besoin de repos de l'enfant après la crise.

Si l'enfant est connu pour une épilepsie

10. Je me réfère au protocole d'urgence d'épilepsie signé par le neuropédiatre de l'enfant.

À ne pas faire !

Mettre les doigts ou un objet dans la bouche durant la crise
De donner à boire
De serrer l'enfant pour éviter les spasmes
D'essayer de mettre l'enfant debout ou assis, « de l'activer »

Si l'enfant présente une perte de connaissance avec un arrêt respiratoire.

Suivre l'algorithme BLS-AED 2015

L'administration d'un médicament d'urgence Lors d'une crise d'épilepsie!

1. Je me frictionne les mains avec la solution hydro-alcoolique qui se trouve avec les médicaments d'urgence.
2. Je prépare le médicament à côté de l'enfant avec le protocole d'urgence.
3. Je demande un double contrôle à un-e collègue :
 - Nom, prénom, Date de naissance
 - Nom du médicament, dosage, moyen d'administration
4. J'informe l'enfant qu'il va recevoir un médicament.
5. J'administre le médicament selon le protocole d'épilepsie.
6. J'observe et je suis les indications du protocole d'épilepsie.
7. Après une crise d'épilepsie.
 - ✓ L'enfant a besoin de repos
 - ✓ Mettre l'enfant en position latérale de sécurité
 - ✓ Surveiller l'enfant
8. Je note et je signe la « Fiche nominative d'administration d'un médicament ».
9. Je remplis le calendrier des crises.

Midazolam nasal ou buccal


Intra nasal: mettre la moitié de la quantité de la seringue dans chaque narine avec l'applicateur



Intra buccal: injecter le Midazolam de part et d'autre entre la gencive et la lèvre intérieure (sans l'applicateur).
L'enfant ne doit pas avaler le médicament. Celui-ci doit être en contact avec la muqueuse de la gencive pour être absorbé.



Stesolid rectal



- ✓ Mettre des gants
- ✓ Enlever le bouchon
- ✓ Mettre de l'eau ou un lubrifiant sur l'embout du Stesolid
- ✓ Mettre l'enfant sur le coté
- ✓ Disposer un linge pour préserver la pudeur
- ✓ Écarter les fesses et insérer l'embout à 1/3
- ✓ Injecter tout le produit
- ✓ Maintenir le sachet du microclyste comprimé entre vos doigts tout en le retirant ainsi le médicament ne remontera pas dans le sachet
- ✓ Resserrer les fesses et enlever l'embout

