

Fiches

spécifiques - 3

Drépanocytose

Signes cliniques imposant une consultation en urgence :

- Une douleur qui ne cède pas au traitement antalgique initial
- Une fièvre supérieur à 38.5°C
- Des vomissements, diarrhées importants
- Des signes d'anémie aiguë, c'est-à-dire l'apparition brutale d'une pâleur, d'une fatigue, d'une altération de l'état général
- Une augmentation brutale du volume de la rate ou du volume de l'abdomen
- Un priapisme (érection permanente) qui ne cède pas au traitement initial (boire abondamment, antalgie, tenter d'uriner)

Apporter le carnet à chaque consultation.

Eléments déclencheurs des crises douloureuses

Traitement de fond

Traitement lors de crise douloureuse

Fiches

spécifiques - 4

Drépanocytose

Hospitalisation

Lieu : _____ Durée : _____

Evaluation des connaissances

des parents
 de l'enfant

Enseignement

aux parents
 à l'enfant

Commentaires :

Hospitalisation

Lieu : _____ Durée : _____

Evaluation des connaissances

des parents
 de l'enfant

Enseignement

aux parents
 à l'enfant

Commentaires :

Fiches

spécifiques - 5

Drépanocytose

Agenda des douleurs à domicile

Date	Localisation	Evaluation 0-10	Durée	Antalgie

Fiches

spécifiques - 6

Drépanocytose

Agenda des douleurs à domicile

Date	Localisation	Evaluation 0-10	Durée	Antalgie