

## Prélèvement de sang par ponction veineuse

**Avertissements :** La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

**Cadre de référence :**

- [Hygiène des mains : pourquoi, comment et quand](#)
- [Information et installation du patient](#)
- [Préparation et rangement du matériel](#)
- [REFMED](#)
- [Fichier des examens](#)
- Directive institutionnelle : [Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV](#)
- Directive institutionnelle : [Port du bracelet d'identification des patients \(BIP\)](#)
- Directive institutionnelle : [Gestion de la douleur](#)

### RESUME

Un prélèvement sanguin s'effectue au moyen d'un système clos et stérile, sur prescription médicale. La durée de compression du garrot ne doit pas excéder 1 min et l'ordre d'utilisation des différents tubes doit être respecté afin de ne pas fausser les résultats.

Pour les prélèvements sanguins au moyen d'un cathéter intravasculaire, se référer à la [procédure existante](#).

Prélèvement de sang par ponction veineuse.....	1
DEFINITION.....	3
INDICATIONS.....	3
RISQUES.....	3
CHOIX DE LA VEINE(1).....	3
TECHNIQUE DE SOINS(1–5).....	4
Matériel.....	4
Préparation du soin.....	5
Déroulement du soin.....	5
Finalisation du soin.....	7
VIDEO TUTORIEL.....	7
REFERENCES.....	7
RÉDACTION / RÉVISIONS.....	8

Titre : Prélèvement de sang par ponction veineuse	Référence : DSO-FT -Adultes-016
Version : 1.3	Date d'application : 26/06/2023
Domaine : Adultes	Catégorie : Examens paracliniques et tests faits sur place

---

Titre : Prélèvement de sang par ponction veineuse	Référence : DSO-FT -Adultes-016
Version : 1.3	Date d'application : 26/06/2023
Domaine : Adultes	Catégorie : Examens paracliniques et tests faits sur place

## DEFINITION

Ponction d'une veine périphérique dans le but de prélever un échantillon de sang.

**ATTENTION :** *Après deux échecs consécutifs, il est recommandé de demander à un-e collègue de prendre la relève.*

## INDICATIONS


- Diagnostic
- Suivi des valeurs sanguines
- Détermination du groupe sanguin et Rhésus

## RISQUES

- Douleur/inconfort
- Lésion de la veine
- Hématome, hémorragie, en particulier lors d'altération de la crase
- Épuisement du capital veineux périphérique lors de prélèvements fréquents
- Hémolyse ou coagulation de l'échantillon
- Accident d'exposition au sang
- Malaise vagal, lipothymie, perte de connaissance

## CHOIX DE LA VEINE(1)

- ✓ Se désinfecter les mains
- ✓ Etendre le bras de la patiente/du patient tout en l'inclinant vers le bas et inspecter la fosse antécubitale, l'avant-bras ou le dos de la main.



- ✓ L'identification de la veine doit permettre le choix de l'aiguille adaptée pour la ponction.
- ✓ Mettre en place le garrot 10 cm au-dessus de la veine choisie.
- ✓ Confirmer le choix de la veine par palpation et **retirer le garrot** :
  - La veine cubitale médiane est généralement la veine la plus propice et accessible pour un prélèvement sanguin.
  - Sous la veine basilique se trouvent l'artère ulnaire et le nerf ulnaire, piquer à cet endroit comporte un risque de les endommager et peut occasionner une douleur forte.
  - Ne pas introduire l'aiguille à un endroit où la veine change de direction ou se divise car cela augmente le risque de provoquer un hématome.
- ✓ Se désinfecter les mains

Toujours prendre en compte les renseignements donnés par la personne en lien avec ses accès veineux ainsi que ses préférences.

**ATTENTION !**

- Ne jamais ponctionner un membre porteur d'une fistule artério-veineuse de dialyse.
- Ne pas ponctionner un membre situé du côté d'un curage ganglionnaire axillaire. En cas d'absolue nécessité, un prélèvement peut cependant être envisagé avec un accord strict et documenté (médecin et patient-e)
- Ne pas ponctionner un membre invalide d'une personne hémiplegique. En cas d'absolue nécessité, un prélèvement peut être cependant envisagé avec un accord strict et documenté (médecin et patient-e)
- Ne pas ponctionner un membre perfusé, accidenté, œdématié ou présentant des lésions cutanées (éraflures, abcès, maladie cutanée, etc.).

Pour tout-e patient-e de chirurgie vasculaire, les prises de sang et les poses de cathéters veineux périphériques se font uniquement sur les mains afin de préserver le capital veineux pour les pontages.

**TECHNIQUE DE SOINS(1-5)**



**Matériel**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 solution hydro-alcoolique pour l'hygiène des mains</li> <li>• 1 protection pour le lit/fauteuil</li> <li>• 1 boîte de gants non stériles</li> <li>• 1 antiseptique alcoolique à base de Chlorhexidine 2% pour l'antisepsie cutanée</li> <li>• Compresses stériles 5x5cm</li> <li>• 1 garrot</li> <li>• 1 aiguille à prélèvement ou 1 aiguille à ailette et 1 multi-adaptateur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monovettes® requises</li> <li>• 1 sparadrap</li> <li>• Ruban adhésif si nécessaire</li> <li>• Bons d'exams dûment remplis et étiquettes du/de la patient-e</li> <li>• 1 container pour objets piquants/tranchants</li> </ul> |
|---|---|



Aiguille à ailettes et adaptateur Sarstedt®


Titre : Prélèvement de sang par ponction veineuse	Référence : DSO-FT -Adultes-016
Version : 1.3	Date d'application : 26/06/2023
Domaine : Adultes	Catégorie : Examens paracliniques et tests faits sur place

## Préparation du soin

- ✓ Recueillir l'expérience de la personne en lien avec un prélèvement sanguin antérieur : réactions, préférences, anxiété, peurs, douleur, etc.
- ✓ Anticiper une antalgie adéquate si nécessaire en fonction du contexte, de la demande et des préférences de la personne.
- ✓ Vérifier si nécessaire les conditions du prélèvement sanguin via le [fichier des examens](#) (mise à jeun, quantité de sang, tubes requis, conditions d'acheminement, ordre de priorité des prélèvements, etc.).
- ✓ Vérifier les tubes et l'identité de la personne (oralement et bracelet d'identification). L'étiquetage des tubes doit se faire en présence de la personne afin de vérifier l'identité de cette dernière (voir : [Port du bracelet d'identification des patients](#)) et le nom sur le bon d'examen.


## Déroulement du soin

- ✓ Se désinfecter les mains
- ✓ Installer la patiente/le patient confortablement et mettre la protection pour le lit
- ✓ Choisir la veine par visualisation et palpation (voir : [Choix de la veine](#)).
- ✓ Se désinfecter les mains
- ✓ Connecter l'aiguille/ailette à prélèvement au multi-adaptateur
- ✓ Imprégner une compresse stérile d'antiseptique alcoolique
- ✓ Se désinfecter les mains
- ✓ Procéder à l'antisepsie cutanée du site d'insertion avec la compresse imprégnée, **laisser sécher et ne plus palper la zone désinfectée**
- ✓ Se désinfecter les mains et **mettre une paire de gants non stériles**
- ✓ Mettre le garrot à une largeur de main au-dessus du point de ponction prévu, de façon à pouvoir le retirer rapidement et d'une seule main.
- ✓ Retirer la protection de l'aiguille/ailette.
- ✓ Exercer une traction sur la peau avec le pouce de la main libre à 3-5 cm en dessous du point de ponction prévu pour immobiliser la veine.
- ✓ Insérer l'aiguille/ailette dans la veine avec un angle d'environ 30° (dépend de la taille et de la profondeur de la veine), biseau vers le haut.
- ✓ Stabiliser l'ailette si nécessaire avec du ruban adhésif et **relâcher le garrot**



**ATTENTION** : la durée de compression ne doit pas excéder 1 minute ! Une compression de plus d'une minute peut entraîner des modifications importantes des taux de certains paramètres mesurés

- ✓ Effectuer le prélèvement sanguin **en respectant absolument l'ordre de remplissage des tubes** ci-dessous :



Sarstedt®

Titre : Prélèvement de sang par ponction veineuse	Référence : DSO-FT -Adultes-016
Version : 1.3	Date d'application : 26/06/2023
Domaine : Adultes	Catégorie : Examens paracliniques et tests faits sur place


Aiguille	Aiguille à ailette	
 Sang citraté  Sang sérum / sérum-gel  Sang hépariné / héparine-gel  Sang EDTA  Sang fluorure / citrate-fluorure	<p><b>Avec hémocultures</b></p>  <p>Flacon aérobe (gris/bleu) puis anaérobe (violet)</p>	<p><b>Sans hémocultures</b></p> <div style="background-color: #f8bbd0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Connecter un 1<sup>er</sup> tube neutre (sérum sans additif) afin de purger la tubulure puis l'éliminer</p> </div> <p><i>(NB : sert uniquement à la purge, pas nécessaire de le remplir entièrement)</i></p>
	 Sang citraté  Sang sérum / sérum-gel  Sang hépariné / héparine-gel  Sang EDTA  Sang fluorure / citrate-fluorure	 Sang citraté  Sang sérum / sérum-gel  Sang hépariné / héparine-gel  Sang EDTA  Sang fluorure / citrate-fluorure

- ✓ **Homogénéiser les tubes** en les retournant complètement et lentement au minimum 3x (évite la formation de micro-caillots dans les échantillons)



Sarstedt®

- ✓ Appliquer une compresse sèche sur le point de ponction, retirer l'aiguille/ailette **en la sécurisant** et la jeter directement dans un container à objets piquants/tranchants.



Sarstedt®

	Titre : Prélèvement de sang par ponction veineuse	Référence : DSO-FT -Adultes-016
	Version : 1.3	Date d'application : 26/06/2023
	Domaine : Adultes	Catégorie : Examens paracliniques et tests faits sur place

- ✓ Exercer une pression ferme pendant 15-30 secondes sur le point de ponction dès que l'aiguille est retirée (possibilité de demander l'aide de la patiente/du patient).
- ✓ Mettre un sparadrap sur le point de ponction.
- ✓ Retirer les gants et se désinfecter les mains

### Finalisation du soin

- ✓ Finaliser l'étiquetage des tubes et compléter le remplissage des bons de laboratoires auprès de la personne.
- ✓ Acheminer les tubes au laboratoire selon les instructions du [fichier des examens](#) et dans un **délai de maximum 2 heures**.

### VIDEO TUTORIEL



Visionnez le film tutoriel de cette fiche technique : [Prélèvement sanguin](#)

### REFERENCES



1. World Health Organization. WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy. 2010 [cité 13 déc 2022]; Disponible sur: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44294>
2. Simundic AM, Bölenius K, Cadamuro J, Church S, Cornes MP, Dongen-Lases EC van, et al. Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling: v 1.1, June 2018. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 1 déc 2018;56(12):2015-38.
3. Lister S, Hofland J, Grafton H. The Royal Marsden Manual of Clinical and Cancer Nursing Procedures [Internet]. 10th Edition. Chichester: Wiley-Blackwell; 2020. Disponible sur: <https://www.rmmonline.co.uk/>
4. Fernandez de Pinedo Perez V. JBI Evidence Summary. Blood Specimen Collection: Venipuncture (Adults). The Joanna Briggs Institute. 2017;
5. Sarstedt AG. Mode d'emploi - SARSTEDT Aiguilles Safety Multifly® / Multifly® [Internet]. [cité 16 déc 2022]. Disponible sur: [https://www.sarstedt.com/fileadmin/user\\_upload/99\\_Gebrauchshinweise\\_IFU/GB\\_505/gb\\_505\\_smk\\_0722.pdf](https://www.sarstedt.com/fileadmin/user_upload/99_Gebrauchshinweise_IFU/GB_505/gb_505_smk_0722.pdf)

Titre : Prélèvement de sang par ponction veineuse	Référence : DSO-FT -Adultes-016
Version : 1.3	Date d'application : 26/06/2023
Domaine : Adultes	Catégorie : Examens paracliniques et tests faits sur place

## RÉDACTION / RÉVISIONS



Cette version annule et remplace toute version antérieure.

Etapes	Auteurs	Date	Experts consultés :	Date :
Révision	Groupe Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne CHUV	12.2022		
Rédaction	Groupe Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne CHUV	02.2019	HPCI-CHUV, Hygiène, prévention et contrôle de l'infection, Lausanne	02.2019

Pour toute question concernant cette fiche technique, merci de contacter le groupe « Méthodes de soins » à l'adresse mail suivante : [dso.methodesoins@chuv.ch](mailto:dso.methodesoins@chuv.ch)

Titre : Prélèvement de sang par ponction veineuse	Référence : DSO-FT -Adultes-016
Version : 1.3	Date d'application : 26/06/2023
Domaine : Adultes	Catégorie : Examens paracliniques et tests faits sur place