



Centre hospitalier universitaire vaudois

Service de pathologie clinique
Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
<http://www.chuv.ch/pathologie>

Laboratoire de cytologie

Tél. : 021 314 71 45
Fax : 021 314 71 44
Pneumatique: 620
Lundi – Vendredi : 08h00-17h00

Patient

Nom:
Prénom:.....
Sexe:
Date de naissance: ... / ... /
Adresse complète:
.....
N° postal/Localité:
.....
V/réf:

Facture:

Patient (ambulatoire) Demandeur (hospitalisé)
Caisse maladie:

Etiquette code barres pour le CHUV



Date et heure de prélèvement indispensables

Jour / Mois / Année: / /
Heure / Minutes :
Signature (si bon papier):

DEMANDEUR:

Nom du médecin:.....
Adresse:.....
Bip/Tél:.....

COPIE(S) à (adresse exacte et complète):

1:
2:
3:

Etiquette déviation

Diagnostic clinique / examens antérieurs (N°):

Ou
Etiquette de projet

Prélèvement:

Exocol
 Endocol
 Vagin
Autre:

Informations complémentaires

Date des dernières règles: / /
Durée de la ménopause:
 Pilules Grossesse
 DIU Post-partum
Traitements (hormones, RX, etc)

Demandes particulières

HPV
 HPV si atypies
 uniquement HPV

Résultats (zone réservée à la pathologie)

Screening:

Techniques de prélèvement pour frottis conventionnels

Pour tous renseignements ou commandes de matériel tél. 079 556 62 95

Matériel :

- spéculum vaginal
- spatule d'Ayre
- lame (bien identifier la lame au nom et prénom de la patiente)
- cyto-fixatif

Eviter de mettre de la poudre de talc ou du lubrifiant. Si c'est inévitable, utiliser un minimum de lubrifiant.

Frottis vaginal :

Après insertion du spéculum, prélever les sécrétions du fond vaginal à l'aide d'une spatule et étaler longitudinalement, en une seule fois, sur une lame. Fixer la lame immédiatement avec le cyto-fixatif .

Frottis exo et endocervicaux:

A l'aide de la partie évasée de la spatule d'Ayre, prélever la *zone exocervicale* . Gratter toute la partie externe de la zone de jonction en faisant une rotation de 360°. Etaler longitudinalement, en une seule fois, sur la moitié de la lame.



Avec l'autre partie de la spatule, prélever la *zone endocervicale* en faisant pivoter la spatule d'un angle de 360°. Etaler longitudinalement, en une seule fois, sur l'autre moitié de la lame.



NOM PRENOM	EXO
	ENDO

Fixer la lame immédiatement avec le cytofixateur.

Prélèvement endocervical à l'aide de la cytobrosse :

Tourner la cytobrosse délicatement dans l'endocol afin d'éviter les saignements. Pour l'étalement sur la lame, rouler la brosse d'un bout à l'autre de la lame. En déposant ainsi le matériel, les cellules ne seront pas déchiquetées . Fixer la lame immédiatement avec le cytofixateur.

N.B. Ne jamais utiliser d'écouvillon pour prélever un spécimen endocervical, car les cellules seront alors desséchées et déchiquetées et l'interprétation impossible

Frottis monocouches (ThinPrep Pap Test) :

Utiliser des spatules en plastique et/ou des cytobrosses.

Agiter immédiatement et énergiquement la spatule ou la brosse dans le flacon (identifié au nom et prénom de la patiente) contenant la solution PreservCyt . Pour une bonne étanchéité du flacon lors du transport, aligner le point noir du bouchon sur celui du flacon.

Spatules, cytobrosses et flacons sont à votre disposition sur simple demande par fax au 021/314 71 44.