Service de pharmacie

Unité de pharmacie clinique
Tél. 079 556 73 60
Email : assistance.pha@chuv.ch

Unité de production pharmaceutique
Tél. 079 556 90 46
Email : pha.production@chuv.ch

GARGARISME CONTRE LES APHTES

Formule CHUV

Formule pour 200 mL :

Produits	Quantité
Sodium bicarbonate Ph. Eur.	1.2g
Benocten® gouttes 60 mg/ml	10 gttes
Xylocaïne® gel 2 %[1]	17 ml
Eau stérile	183 ml
Volume final	**200 ml**

Il est possible d'utiliser, en lieu et place des gouttes de Benocten®, de la diphenhydramine HCl.

La formule devient :

Produits	Quantité
Sodium bicarbonate Ph. Eur.	1.2 g
Diphenhydramine HCl	21.2 mg
Xylocaïne® gel 2 %[1]	17 ml
Eau stérile	183 ml
Volume final	**200 ml**

[1] Xylocaïne gel 2% peut être remplacé par une solution injectable de lidocaïne à 2%.

Mode opératoire :

- Peser le sodium bicarbonate et la diphenydramine dans un bécher et dissoudre dans 1/3 d'eau stérile chaude.
- Ajouter Xylocaine® gel.
- Compléter avec de l'eau ad 200 ml.
- Distribuer dans les flacons.

Expiration : 2 semaines.

Conditionnement : Flacon Veral 200 ml.

Stockage : Frigo (2-8°C), également pour augmenter le pouvoir anesthésiant.

Posologie : Adultes: 1 cuillère à soupe (15 ml) non dilué 3 à 5 fois par jour.
Enfants : tamponner localement à l'aide d'un coton-tige ou administrer selon OM.

Précautions : Après un gargarisme, respecter un délai de 30 minutes avant une prise alimentaire ou de boisson (risque de fausse route).
Xylocaïne® gel contient 2% de lidocaïne HCl.