

## **ACETAZOLAMIDE 5 mg/ml**

Suspension orale avec sucre

**Formule pour 100 ml :**

<b>Produits</b>	<b>Quantité</b>
Acétazolamide (Diamox® 250 mg)	2 cpr = 500 mg
Ora-Plus	50 ml
Ora-Sweet	ad 100 ml

**Mode opératoire :**

- Dans un mortier, broyer les comprimés. Tamiser ensuite la poudre et la réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

**Expiration :** 2 mois.

**Conditionnement :** Flacon Veral 100 ml. Etiquette "Bien agiter !".

**Stockage :** Température ambiante.

**Références :** Allen LV, Erickson MA. Stability of acetazolamide [...] in extemporaneously compounded oral liquids. *Am J Health-Syst Pharm.* 1996; 53: 1944-9.

Documentation Paddock : <http://www.paddocklabs.com/comstudies.html>.

Jew Rita K. Extemporaneous Formulations, Children Hospital of Philadelphia, American Society of Health-System Pharmacist, 2003.