

AMLODIPINE 1 mg/ml

Suspension orale avec sucre

Formule pour 100 ml :

Produits	Quantité
Amlodipine (Norvasc® 10 mg ou générique)	10 cpr = 100 mg
Ora-Plus	50 ml
Ora-Sweet	ad 100 ml

Mode opératoire :

- Dans un mortier, broyer les comprimés. Tamiser ensuite la poudre et la réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 2 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml. Etiquette "Bien agiter !".

Stockage : Frigo (2-8°C).

Références : Nahata MC et al. Stability of amlodipine besylate in two liquids dosage forms. *J Am Pharm Assoc.* 1999; 39 (3): 375-7.

Documentation Paddock : <http://www.paddocklabs.com/comstudies.html>.

Jew Rita K. Extemporaneous Formulations, Children Hospital of Philadelphia, American Society of Health-System Pharmacist, 2003.