

AZATHIOPRINE 25 mg/ml

Suspension orale avec sucre

Formule pour 100 ml :

Produits	Quantité
Azathioprine (Imurek [®] 50 mg ou générique)	50 cpr = 2500 mg
Ora-Plus	50 ml
Ora-Sweet	ad 100 ml

Précautions :

D'après le fabricant, il faut manipuler Imurek[®] comme pour les cytostatiques. Ce médicament ne doit être administré que par des personnes habituées au maniement de tels produits. Mettre une blouse, des gants et un masque.

Mode opératoire :

- Dans un bécher, placer 50 comprimés de Imurek[®] 50 mg.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- Ajouter Ora-Plus dans le bécher.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet .
- Agiter avec un barreau magnétique jusqu'à dissolution des comprimés.
- Distribuer dans un flacon de 100 ml.

Expiration : 2 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml. Etiquette "Bien agiter !".

Stockage : Température ambiante.

Références : Rita K. Jew et al., Extemporaneous Formulations, American Society of Health-System Pharmacists. 2003; 6.

Allen Jr LV, Erickson III MA. Stability of acetazolamide, allopurino, azathioprine, clonazepam and flucytosine in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health-Syst Pharm 53.

Documentation Paddock : <http://www.paddocklabs.com/comstudies.html>.