

## **DILTIAZEM 2 mg/ml**

Suspension orale avec sucre

### **Formule pour 100 ml :**

<b>Produits</b>	<b>Quantité</b>
Diltiazem HCl (Dilzem® 60 mg)	3.33 cpr = 200 mg
Ora-Plus	50 ml
Ora-Sweet	ad 100 ml

### **Mode opératoire :**

- Dans un mortier, broyer les comprimés et bien mélanger. Tamiser ensuite la poudre au 500.
- Peser la quantité ad hoc de poudre et la réintroduire dans le mortier.
- Mesurer 50 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- L'ajouter par portions à la poudre et bien homogénéiser.
- Transférer cette suspension dans un cylindre gradué.
- Compléter à 100 ml avec Ora-Sweet et bien mélanger.
- Distribuer dans le flacon.

**Expiration :** 1 mois.

**Conditionnement :** Flacon Veral 100 ml. Etiquette "Bien agiter !".

**Stockage :** Température ambiante.

**Références :** Allen LV, Erickson MA. Stability of baclofen, captopril, diltiazem hydrochloride [...] in extemporaneously compounded oral liquid. *Am J Health Syst Pharm.* 1996; 53 (18): 2179-84.

Documentation Paddock : <http://www.paddocklabs.com/comstudies.html>.