



Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Service de pharmacie

Rue du Bugnon 46 CH-1011 LAUSANNE Tél dir. (021) 314 49 96
Fax (021) 314 42 99 E-mail Assistance.Pha@chuv.ch



OMEPRAZOLE 2 mg/ml

pour administration au moyen d'une sonde entérale

Suspension orale

Formule pour 100 ml :

| Produits | Quantité |
|--------------------|--------------------|
| Oméprazole 40 mg | 5 gélules = 200 mg |
| Sodium bicarbonate | 8.4 g |
| Eau déminéralisée | ad 100 ml |

Mode opératoire :

- Dissoudre le bicarbonate de sodium dans l'eau ou utiliser une solution de sodium bicarbonate 8.4 % stérile (Braun).
- Dans un bécher, ouvrir les gélules d'oméprazole à 40 mg et vider leur contenu sans les écraser.
- Ajouter la solution de bicarbonate de sodium 8.4% jusqu'au volume de 100 ml.
- Bien mélanger jusqu'à dispersion des micro-granules.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 45 jours.

Conditionnement : Flacon Veral 100ml. Bien agiter avant l'emploi et protéger de la lumière !

Stockage : Frigo (2-8°C).

Références : DiGiacinto JL et al. Stability of suspension formulations of lansoprazole and omeprazole stored in amber-colored plastic oral syringes. *Ann Pharmacother.* 2000; 34: 600-4.

Quercia RA et al. Stability of omeprazole in an extemporaneously prepared oral liquid. *Am J Health-Syst Pharm.* 1997; 54: 1833-6.