



Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Service de pharmacie

Rue du Bugnon 46 CH-1011 LAUSANNE Tél dir. (021) 314 49 96
Fax (021) 314 42 99 E-mail Assistance.Pha@chuv.ch



OSELTAMIVIR 15 mg/ml pour administration pédiatrique

Suspension orale

Formule pour 10 ml (adapter le volume au prorata de la posologie prescrite)

Produits	Quantité
Tamiflu 75 mg	2 gélules
Ora-Sweet	9.6 ml
Flacon Veral	1
Embout Baxa (ou autre dispositif de prélèvement par seringue orale)	1
Bouchon inviolable (sécurité enfant)	1

Mode opératoire :

- Vider les gélules de Tamiflu dans un mortier.
- Broyer jusqu'à obtenir une fine poudre.
- Ajouter 1/3 d'Ora-Sweet et mélanger jusqu'à obtenir une suspension homogène.
- Transférer cette suspension dans le flacon Veral.
- Ajouter un autre tiers (1/3) d'Ora-Sweet et mélanger en récupérant la poudre restée dans le mortier et sur le pistil.
- Transférer cette portion dans le flacon Veral.
- Ajouter le dernier tiers (1/3) d'Ora-Sweet et mélanger en rinçant le mortier et le pistil. Utiliser un racloir pour récupérer le solde de sirop au fond du mortier.
- Ajouter l'embout Baxa (ou équivalent) et le bouchon inviolable (sécurité enfant).
- Etiqueter.

Expiration : 35 jours au Frigo ($5 \pm 3^{\circ}\text{C}$)

Conditionnement : Flacon Veral de volume adapté (penser à garder un volume d'air suffisant pour permettre une bonne agitation). Bien agiter avant l'emploi !

Stockage : Frigo ($2-8^{\circ}\text{C}$). Stable 5 jours à température ambiante.

Références : <http://www.tamiflu.com/hcp/dosing/extprep.aspx>

Commentaire : L'oseltamivir est très soluble dans l'eau. Le dépôt observé au fond du flacon est constitué des excipients de la poudre des gélules.