



Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Service de pharmacie

Rue du Bugnon 46 CH-1011 LAUSANNE Tél dir. (021) 314 49 96
Fax (021) 314 42 99 E-mail Assistance.Pha@chuv.ch



VALGANCICLOVIR 60 mg/ml

Suspension orale avec sucre

Formule pour 120 ml :

Produits	Quantité
Valganciclovir (Valcyte® 450 mg)	16 cpr = 7200 mg
Ora-Plus	60 ml
Ora-Sweet	ad 120 ml

Précautions :

D'après le fabricant, les comprimés ne devraient être ni cassés ni écrasés, étant donné que le Valcyte est potentiellement tératogène et cancérigène chez l'homme. Il faut éviter tout contact direct entre la peau ou les muqueuses et les comprimés cassés ou écrasés, et éviter toute inhalation de résidus en poudre. Mettre une blouse, des gants et un masque.

Mode opératoire :

- Dans un mortier, placer 16 comprimés de Valcyte 450 mg.
- Mesurer 60 ml d'Ora-Plus dans un cylindre gradué.
- Ajouter 5 ml de Ora-Plus dans le mortier, sur les comprimés.
- Broyer les comprimés afin de former une pâte.
- Ajouter Ora-Plus par portions et bien homogénéiser après chaque ajout.
- Transférer la suspension obtenue dans un cylindre gradué.
- Compléter à 120 ml avec Ora-Sweet en rinçant le mortier et bien mélanger.
- Distribuer dans un flacon de 200 ml.

Expiration : 1 mois.

Conditionnement : Flacon Veral 200 ml. Etiquette "Bien agiter!".

Stockage : Frigo (2-8°C).

Références : Henkin et al., Stability of valganciclovir in extemporaneously compounded liquid formulations, Am J Health Syst Pharm. 2003; 60: 687-690.

Documentation Paddock : <http://www.paddocklabs.com/comstudies.html>