

სასწრაფო დახმარების განყოფილება

ანალური ნაპრაღი

რჩევები სახლში დაბრუნების შემდეგ



თქვენ გიმკურნალეს ანალური ნაპრალის გამო.
ეს დოკუმენტი გაწვდით ინფორმაციას იმ
მკურნალობის შესახებ, რომელიც უნდა
დაიცვათ საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ.

რა არის ანალური ნაპრალი ?

ანალური ნაპრალი წარმოადგენს ანალური არხის ლორწოვანი
გარსის (ქსოვილის თხელი ფენა) ზედაპირულ გახეთქვას ან
წყულულს, რომელიც მდებარეობს ანუსის სიახლოვეს.

რა მკურნალობა ინიშნება ?

საფადართო
საშუალებები

განავლის დასარბილებლად
მიიღეთ საფადართო საშუალება
ეჭიმის დანიშნულების შესაბამისად.

ადგილობრივი
ანესთეზიური
საშუალება

ტკივილის შესამცირებლად დეფეკაციის
დროს
წაისვით სისტემატიურად დანიშნული
კრემი ანალურ არეზე, დეფეკაციამდე
10 წუთით ადრე.

პროქტოლოგიური
კრემი

შეზორცების ხელშეწყობისთვის
დეფეკაციის შემდეგ წაისვით კრემი
ანუსის შესასვლელთან 6 კვირის
განმავლობაში.

გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები

შხაპი	მიიღეთ შხაპი დღეში 2-ჯერ, 2 კვირის განმავლობაში. მიმართეთ წყლის ჭავლი პირდაპირ ანუსის არეზე, რათა საფუძვლიანად ჩამოიბანოთ.
მედიკამენტები	მიიღეთ წამლები სამედიცინო პერსონალის მიერ მოცემული მითითებებისა და თქვენი რეცეპტის შესაბამისად.
ბანაობა	აბაზანის მიღება და ბანაობა (საცურაო აუზი, ტბა ან ზღვა) შესაძლებელია მხოლოდ სრული შეხორცების შემდეგ.
დეფეკაციის დროს	დეფეკაციის დროს მუხლები აწეული გქონდეთ, რათა თავიდან აიცილოთ ზედმეტი დაძაბვა. შემდეგ გაწმინეთ ანალური არე ნესტიანი ხელსახოცით.
ჰიდრატაცია და კვება	დალიეთ ჩვეულებრივად. მოერიდეთ ცხარე და შეკრულობის გამომწვევ საკვებს.

რა მოხდება შემდეგ?

ექიმის მიერ შესავსები :

- ჩანიშნეთ ვიზიტი თქვენს ოჯახის ექიმთან კონტროლისთვის.
- ჩანიშნეთ ვიზიტი თქვენს მიერ არჩეულ პროქტოლოგთან ან CHUV პროქტოლოგიის კონსულტაციის ნომერზე 021 314 55 63.



სხვა ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ოჯახის ექიმს ან იმ ფარმაცევტს, რომელმაც დაგინიშნათ მკურნალობა.



სკანირება სხვა ენებისთვის
Scan for other languages